

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ХИМИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ
БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ, БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ И СОРНЯКАМИ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРО - КОЛИЧЕСТВ ПЕСТИЦИДОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, КОРМАХ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

Справочное
издание

Под редакцией
доктора биологических наук М. А. КЛИСЕНКО



МОСКВА «КОЛОС» 1983

ББК 44

М54

УДК 632.95.028(031)

Члены редколлегии: Л. Г. Александрова, Д. Б. Гиренко, А. А. Калинина, К. Ф. Новикова, Т. М. Петрова, В. Н. Полякова, В. И. Федотова, Г. А. Хохолькова.

М 54 Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочное издание/М-во сел. хоз-ва СССР. Гос. комис. по хим. средствам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; Под ред. М. А. Клисенко. — М.: Колос, 1983. — 304 с., ил.

В справочник включены официально утвержденные Министерством здравоохранения СССР методы определения остаточных количеств хлорорганических, фосфорорганических, *симл*-триазиновых, ртутьорганических и других групп пестицидов, а также биопрепаратов в продуктах питания, кормах и внешней среде. Для специалистов химических лабораторий.

М $\frac{3802020000-133}{035(01)-83}$ 158—83

ББК 44
632

© Издательство «Колос», 1983

ПРЕДИСЛОВИЕ

Повышение благосостояния народа всегда находится в центре внимания КПСС. Об этом свидетельствует разработанная в соответствии с решением XXVI съезда партии и одобренная майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС Продовольственная программа СССР на период до 1990 года. Одной из важнейших задач этой программы является развитие материально-технической базы агропромышленного комплекса, что предусматривает, в частности, расширение производства высокоэффективных средств защиты растений и увеличение их поставки сельскому хозяйству. Более широкое применение химических средств защиты растений позволит получать большую урожайность сельскохозяйственных культур, улучшит качество выращиваемой продукции и условия ее хранения.

Однако если неумело использовать химические средства защиты растений, то остатки пестицидов могут попасть в продукты питания, корма и объекты окружающей среды. Поэтому правильному применению пестицидов в нашей стране, как и вообще охране окружающей среды, уделяется особенно большое внимание. Научно обоснованной программой охраны природы в СССР явились постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов» (1972 г.) и «О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению использования природных ресурсов» (1978 г.), которые директивно обязывают вести контроль за остатками пестицидов в продуктах питания, воде, почве и воздухе. Для предотвращения загрязнения окружающей среды пестицидами введено строгое регламентирование их применения, совершенствуются технология получения и применения пестицидов и препаративные формы их. Одно из обязательных требований, которое позволяет включать пестициды в список препаратов, разрешенных к применению, является разработка методов определения их остатков в продуктах питания, воде, почве и воздухе.

В предлагаемой книге представлены методические указания по определению остаточных количеств пестицидов в различных средах, разработанные специалистами-аналитиками различных министерств и ведомств. В разработке данных указаний принимали участие: Т. Г. Аббасов, В. Д. Агарков, С. Л. Акоронко, Т. В. Алдошина, И. А. Антонова, Ж. А. Арутюнян, Г. У. Аслалян, Э. И. Бабкина, Ю. С. Баранов, Г. А. Бегунов, А. Б. Белова, С. Г. Билуши, Н. П. Бирюков, Ц. И. Бобовникова, З. Н. Богомолова, М. Ф. Болоховец, К. А. Большакова, Г. С. Борисов, А. М. Ботвиньева, Л. И. Бублик, Г. Т. Брюшнина, Н. В. Букина, А. Л. Бурштейн, А. С. Василенко, Л. В. Васильковская, Р. Д. Васягина, Л. В. Воронич, И. В. Воинова, К. А. Гар, С. Г. Геворкян, В. М. Гезиков, Г. Н. Георгиева, Д. Б. Гиренко, И. Н. Гладенко, Н. И. Глембицкий, В. Е. Горбунова, Р. С. Горенштейн, В. А. Давтян, Э. Б. Данилова, Е. Г. Даурова, В. Ф. Демченко, А. В. Дибцева, Т. А. Евстегнеева, В. В. Егоров, Ф. В. Ермаков, А. В. Жарков, В. Н. Жуленко, А. Ф. Заболотный, И. Ш. Заманская, А. И. Затула, И. З. Зисерман, З. Златьев, А. И. Зорева, Т. И. Зубко, Л. Н. Кавецкая, И. Н. Карпова, У. С. Кашимов, В. И. Кириченко, Н. И. Киселева, М. А. Клисенко, Е. С. Ковалева, А. Ф. Конюхов, В. В. Королев, Ф. И. Копытова, Е. И. Косачева, И. А. Кочеровская, В. И. Кофанов, И. Ш. Кофман, А. Н. Крылова, О. С. Кухтина, В. В. Лешев, Л. И. Лещинская, С. А. Ликунова, А. М. Макеева, О. А. Малинин, И. Н. Матvienко, И. Л. Меерзон, Ф. Р. Мельцер, Л. Д. Микадзе, Г. В. Миронюк, Н. А. Мовсетын, В. В. Молочников,

А. П. Моргунова, Г. К. Морина, Ю. Ф. Моряков, В. И. Мочалов, В. И. Мурзой, А. А. Непоклонов, И. П. Нестерова, К. Ф. Новикова, Л. В. Новикова, Н. И. Павлова, Ф. И. Патрашку, К. Н. Пашкевич, С. Д. Павлов, Т. М. Петрова, Н. В. Перетолчин, Р. Д. Петухов, М. С. Петросян, А. Л. Перцовский, И. И. Пиленкова, М. В. Письменная, Т. В. Пластинина, Л. Р. Полищук, В. Н. Полякова, Н. Г. Попова, Н. Я. Пестовский, Л. С. Приутина, Ю. А. Присмотров, Н. В. Птицина, У. Ф. Пулатов, Г. П. Пушкина, Б. А. Рехтер, Л. Д. Рузанкова, Н. И. Ряженов, П. А. Самгин, Э. О. Сахкалян, В. А. Силаев, М. А. Стемковская, Л. С. Самосват, Л. А. Смирнова, А. А. Сиверина, Л. К. Слепова, Ж. С. Степанян, Н. Г. Степанченко, В. В. Стеценко, Г. А. Таланов, С. М. Тихомиров, Г. А. Трондина, Г. П. Угрюмова, А. Д. Фатьянова, Б. Ф. Филимонов, М. М. Филимонова, Л. А. Хилик, Л. И. Хлюпина, В. Д. Чмиль, Д. И. Чканников, Л. Д. Чудакова, Э. П. Чурпий, Н. И. Шадриц, А. М. Шмигидина, А. И. Шумкова, З. Ф. Юркова.

Методические указания апробированы группой экспертов при Госкомиссии по химическим средствам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками Министерства сельского хозяйства СССР, одобрены лабораторным советом при Министерстве здравоохранения СССР и утверждены заместителем Главного государственного санитарного врача СССР в качестве официальных.

Методические указания предназначены для контроля за содержанием остаточных количеств пестицидов и биопрепаратов в сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктах, кормах, объектах окружающей среды агрохимическими, ветеринарными, контрольно-токсикологическими лабораториями Министерства сельского хозяйства СССР, санитарно-эпидемиологическими станциями и научно-исследовательскими институтами Министерства здравоохранения СССР, лабораториями Госкомгидромета СССР, а также лабораториями научно-исследовательских институтов других министерств и ведомств, занимающихся определением остаточных количеств пестицидов и биопрепаратов в продуктах питания, кормах и внешней среде.

ПРОИЗВОДНЫЕ КУМАРИНА

Утверждаю
Заместитель Главного
государственного санитарного
врача СССР
А. И. Заиченко
20.12.1976 № 1550—76

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗООКУМАРИНА В ТКАНЯХ И КРОВИ ЖИВОТНЫХ, В ПРИМАНКАХ И ПРЕПАРАТЕ (ПЕНОКУМАРИН) ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ *

Краткая характеристика препарата. Зоокумарин — *dl*-3-(α -ацетонилбензил)-4-оксикумарин. Эмпирическая формула $C_{19}H_{16}O_4$, молекулярная масса 308,3. Препарат применяют для борьбы с грызунами в животноводческих помещениях в форме пищевых приманок, содержащих 0,025% препарата. Это сильнодействующее вещество (1-я группа государственной классификации). ЛД₁₀₀ для серых крыс — 4—14 мг/кг, кошек и собак — 30—60 мг/кг. Коэффициент кумуляции 0,4. Рацемическая *dl*-форма пестицида представляет собой бесцветные кристаллы с т. пл. 159—161°C, без запаха. Препарат малолетуч, сохраняет токсические свойства в течение нескольких лет, не растворяется в воде, бензоле, хорошо растворим в ацетоне, хлороформе и диоксане.

Методики определения зоокумарина в тканях и крови животных, в приманках и препарате (пенокумарин). Основные положения. Зоокумарин определяют тонкослойной или газо-жидкостной хроматографией, а также спектрофотометрическим методом. Принцип методов. Хроматографические методы основаны на извлечении зоокумарина из биологических объектов хлороформом, очистке экстракта на колонке с окисью алюминия и последующем хроматографическом определении пестицида в закрепленном тонком слое силикагеля по реакции диазосочетания или в виде метилового эфира на газовом хроматографе с электронно-захватным детектором.

Спектрофотометрический метод основан на извлечении зооцида из пенокумарина, кормов, мышечной ткани и крови животных хлороформом, последующей очистке экстракта на колонке с окисью алюминия и определении натриевой соли зоокумарина по характерному поглощению света в ультрафиолетовой области спектра при 308 нм.

Метрологическая характеристика методов. Нижний предел определения тонкослойной хроматографией 2 мкг зоокумарина в пробе, что составляет 0,2 мг/кг. Минимально детектируемое количество зоокумарина на газовом хроматографе 1 нг, или 0,02 мг/кг. Степень определения составляет $80 \pm 5\%$. Нижний предел определения спектрографическим методом 10 мкг вещества в 0,4 мл пенокумарина, в 0,5 г корма, в 25 г мышечной ткани и крови животных. Степень определения зооцида $90 \pm 5\%$.

Реактивы, растворы. Кислота серная, 1 н. раствор. Хлороформ. Кислота уксусная. Натрий серноокислый безводный. Ацетон. Аммиак водный. Натрий азотистокислый (нитрит натрия), 1%-ный водный раствор. Гексан. Диэтиловый эфир. Кислота соляная, 0,33 н. раствор (готовят из фиксанала). Натрия гидрат окиси (натр едкий), 2%-ный раствор. Вода дистиллированная. Насыщенный раствор 2,4-дихлоранилина в 0,33 н. соляной кислоте: 1 г вещества смешивают со 100 мл 0,33 н. соляной кислоты и встряхивают 1 ч; хранят раствор в темной склянке в холодильнике, реактив устойчив в течение трех месяцев. Реактив для выявления зоокумарина (хромогенный реагент): смешивают 25 мл 1%-ного вод-

* Методические указания разработаны В. В. Ермаковым и М. Ф. Болоховец (ВНИИВС).

ного раствора нитрита натрия с 25 мл насыщенного раствора 2,4-дихлоранлина в 0,33 н. соляной кислоте; готовят не реже раза в неделю. Смесь растворителей, состоящая из гексана и ацетона в соотношении (2 : 1).

Основной раствор зоокумарина 1 мг/мл: растворяют 100 мг вещества в 100 мл ацетона. Рабочий раствор зоокумарина 10 мкг/мл: разбавляют 1 мл основного раствора в 100 мл ацетона. Стандартный раствор зоокумарина и натриевой соли зоокумарина для спектрофотометрических измерений 0,1 мг/мл: растворяют 10 мг зооцида в 2%-ном растворе гидроксида натрия в мерной колбе на 100 мл. Силикагель КСК. Гипс медицинский. Окись алюминия для хроматографии. Кальций хлористый. Калий углекислый (калия карбонат), растертый порошок, прокаленный в течение 6 ч при температуре 160°C; хранят в эксикаторе над безводным хлористым кальцием. Метилирующий реагент: в колбу емкостью 100 мл вносят 5 г безводного карбоната калия, 47,5 мл абсолютного ацетона и 2,5 мл диметилсульфата; после перемешивания реактив хранят без доступа воздуха.

Ацетон абсолютный: 0,5 л ацетона встряхивают 30 мин с 50 г безводного хлористого кальция; обработанный ацетон перегоняют на кипящей водяной бане; первые и последние 50 мл дистиллята отбрасывают, а остальное количество собирают в склянку с притертой пробкой. Хранят без доступа воздуха. Натрий хлористый, насыщенный водный раствор. Метилсилоксан SE-30 (5%), нанесенный на силианизированный хроматон 80—100 меш. Все реактивы должны быть квалификации х. ч. или ч. д. а.

Приборы и посуда. Аналитические весы. Шуттель-аппарат. Хроматографические камеры. Эксикатор. Спектрометр СФ-4а или другой для измерения поглощения в ультрафиолетовой области спектра. Колбы Эрленмейера на 50, 100 и 250 мл. Чашки для выпаривания № 5 и № 10. Мерные цилиндры на 50 и 100 мл. Мерные колбы на 100 мл. Пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл. Микропипетки на 0,1 мл. Воронки для фильтрования № 3 и № 5. Пластины стеклянные размером 9×12 см. Пробирки длиной 15 см, диаметром 1,5 см, градуированные емкостью 15 мл. Колонки стеклянные для хроматографии длиной 35 см, внутренним диаметром 1,5 см. В качестве колонки можно использовать нижнюю часть бюретки на 100 мл, разрезав ее пополам.

Газовый хроматограф «Цвет-5-68», ЛХМ-8МДП или другой с электронно-захватным детектором. Колонка для газовой хроматографии стеклянная, длиной 0,75 м, диаметром 3 мм. Микрошприцы на 10 мкл. Баня водяная. Мельница шаровая. Ступка фарфоровая.

Подготовка к определению связана с приготовлением силикагеля и пластинок. Гранулы силикагеля КСК размалывают в шаровой мельнице, после чего 500 г фракции, просеянной через сито 100 меш, смешивают с 1 л соляной кислоты, предварительно разбавленной в 2 раза водой. Через 12 ч надосадочную жидкость декантируют, а осадок промывают 3 раза дистиллированной водой по 1 л до нейтральной реакции. Силикагель высушивают при комнатной температуре и промывают его трижды по 300 мл диэтиловым эфиром. После высушивания адсорбент просеивают через сито 100 меш. Для приготовления пластинок 14 г силикагеля и 1 г прокаленного при 150°C в течение 6 ч медицинского гипса тщательно растирают в фарфоровой ступке в течение 20 мин до получения однородной массы. Затем порошок переносят в колбу на 250 мл, вносят 40 мл дистиллированной воды и смесь энергично встряхивают 15 мин до удаления пузырьков воздуха. Полученную гомогенную смесь наносят на пластинки по одной чайной ложке, пластинки высушивают при комнатной температуре в течение суток. Можно использовать пластинки «Силуфол».

Ход анализа. Экстракция зоокумарина из мышечной ткани и крови животных и очистка экстракта. Пробу 25 г гомогенизированного образца (мышечная ткань, кровь и другой материал, не подвергшийся гниению) помещают в колбу Эрленмейера на 250 мл, куда вносят 10 мл 1 н. серной кислоты. Содержимое перемешивают, добавляют 75 мл хлороформа и встряхивают на шуттель-аппарате 40 мин. Затем в колбу вносят через фильтровальную воронку небольшими порциями (чтобы избежать образования комков) 65 г сульфата натрия. Отделившийся хлороформный экстракт фильтруют в колбочку на 100 мл через тампон стекловаты (или обычной ваты). Извлечение препарата повторяют еще раз с 50 мл хлороформа и образец встряхива-

ют 15 мин. Профильтрованный через ватный тампон экстракт соединяют с первой фракцией.

Объединенные порции экстракта пропускают через колонку, которую готовят следующим образом. В ее нижнюю часть помещают слой ваты (1 см), вносят 10 г окиси алюминия и промывают 20 мл хлороформа, затем вносят экстракт. После того как весь экстракт опустится до адсорбента, колонку промывают 100 мл чистого хлороформа, а затем 20 мл ацетона (для удаления коэкстрактивных веществ). Зоокумарин элюируют 50 мл смеси ацетона и 2%-ного раствора гидрата окиси натрия (47:3). Элюат собирают в фарфоровую чашку № 10, добавляют 0,2 мл ледяной уксусной кислоты и выпаривают досуха на кипящей водяной бане.

Для определения зоокумарина на спектрофотометре уксусную кислоту не добавляют.

Экстракция зоокумарина из препарата пенокумарин и очистка экстракта. После двухминутного энергичного встряхивания баллона с препаратом отбирают около 1 г препарата в колбу Эрленмейера на 100 мл. Для хроматографического определения на каждые 20 мг пенокумарина добавляют 1 мл ацетона. Содержимое колбы перемешивают и выдерживают 30 мин при комнатной температуре. Затем 0,4 мл раствора переносят в фарфоровую чашку № 5, добавляют 0,2 мл ледяной уксусной кислоты и выпаривают досуха на кипящей водяной бане.

Для определения зоокумарина на спектрофотометре отбирают около 1 г препарата в колбу Эрленмейера на 100 мл. Пенокумарин растворяют в 2%-ном растворе гидроокиси натрия из расчета 1 мл растворителя на 20 мг образца. Содержимое колбы перемешивают и выдерживают на водяной бане при 60°C до исчезновения пены. Затем раствор фильтруют через бумажный фильтр.

Экстракция зоокумарина из кормов (приманок) и очистка экстракта. Пробу 0,5 г корма (приманки в целых или размолотых зернах) помещают в колбу Эрленмейера на 100 мл, куда вносят 3 мл 1 н. серной кислоты. Содержимое перемешивают, добавляют 25 мл хлороформа и встряхивают на шуттель-аппарате 40 мин. Затем в колбу вносят через фильтровальную воронку небольшими порциями 8—10 г сульфата натрия. Отделившийся хлороформный экстракт фильтруют через ватный тампон в колбочку на 50 мл. Извлечение повторяют еще раз, добавляя 15 мл хлороформа, и встряхивают образец в течение 15 мин.

Экстракт фильтруют через ватный тампон и полученную порцию фильтрата соединяют с первой фракцией, а затем пропускают через колонку, которую готовят так же, как и при исследовании мышечной ткани или крови. Колонку промывают 20 мл хлороформа. Когда весь экстракт опустится до адсорбента, колонку промывают последовательно 50 мл хлороформа и 20 мл ацетона. Зоокумарин элюируют 50 мл смеси ацетона и 2%-ного раствора гидроокиси натрия (47:3). Элюат собирают в фарфоровую чашку № 10, добавляют 0,2 мл ледяной уксусной кислоты и выпаривают досуха на кипящей водяной бане. При спектрофотометрическом определении зоокумарина уксусную кислоту не добавляют.

Определение тонкослойной хроматографией. Полученный после выпаривания остаток растворяют в 0,5 мл ацетона и полностью наносят на пластинку микропипеткой или пипеткой Пастера. Одновременно готовят стандарты, внося в фарфоровую чашку 5—10 мкг вещества, что соответствует 0,5—1,0 мл рабочего раствора зоокумарина. Образцы наносят на пластинки в следующей последовательности: стандарт (5 мкг), образец (I повторность), образец (II повторность), стандарт (10 мкг). Размер пятна не должен превышать 0,5 см. Места нанесения проб располагают на расстоянии 1,5—2,0 см друг от друга и от нижнего и боковых краев пластинки; пятна не должны погружаться в растворитель.

В камеру для хроматографирования (эксикатор) наливают 60 мл смеси гексана и ацетона (2:1) и через 20 мин помещают пластинку в вертикальном положении. Камеру герметично закрывают. Хроматографирование проводят при температуре не ниже 20°C. После того как растворитель поднимется на высоту 8—9 см, пластинку вынимают, отмечают фронт растворителя и помещают в сушильный шкаф при 105°C на 3 мин. Затем пластинку охлаждают и опрыскива-

ют из пульверизатора хромогенным реагентом, вновь высушивают при тех же условиях и помещают в эксикатор над парами аммиака на 1 мин. Зоокумарин проявляется в виде коричневых пятен на желтом фоне с Rf 0,4—0,5 в тонком слое силикагеля и Rf 0,29—0,35 на «Силуфоле». Количество пестицида в пробе определяют сравнением интенсивности окраски и площади пятна стандарта и образца. В случае если содержание зооцида в пробе превышает 10 мкг, то следует получить хроматограмму стандартов большей концентрации (20—100 мкг).

Расчет результатов анализа при тонкослойной хроматографии. Содержание зоокумарина в исследуемой пробе (X , мг/кг) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{A}{P},$$

где A — содержание зоокумарина в исследуемой навеске, мкг; P — масса пробы, г.

Определение газо-жидкостной хроматографией. Полученный после выпаривания остаток растворяют 3 мл метилирующего реагента и переносят в пробирку длиной 15 см, диаметром 1,5 см, содержащую 500 мг безводного карбоната калия. Пробирку закрывают ватным тампоном и выдерживают в водяной бане при 65°C в течение 15 мин. Затем содержимое переносят в делительную воронку емкостью 100 мл посредством 30 мл дистиллированной воды и 5 мл гексана. Метилловый эфир зоокумарина экстрагируют путем встряхивания делительной воронки в течение 2 мин, водную фазу отбрасывают, экстракт промывают 15 мл насыщенного водного раствора хлористого натрия и сливают в сухую пробирку.

В испаритель газового хроматографа с электронно-захватным детектором вводят 5—10 мкл экстракта при следующих условиях: расход газа-носителя 80 мл/мин, поддув 120 мл/мин. Температура колонки, детектора и испарителя соответственно 225, 250 и 250°C. Чувствительность электрометра $1 \cdot 10^{-11}$ А. Скорость протяжки ленты самописца 1 см/мин. Время удерживания метилового эфира зоокумарина 2,5 мин. Высота пика при введении в испаритель 10 нг вещества 80 мм. Линейный диапазон от 5 до 25 нг.

Количественное определение проводят методом абсолютной калибровки, по градуировочному графику, по высоте пика. График строят в интервале концентрации от 5 до 20 нг зоокумарина. С этой целью в фарфоровые чашки вносят 5, 10 и 20 мкг зоокумарина в ацетоне. Ацетон выпаривают, а остаток метилируют, как и пробы. Введение в испаритель хроматографа 5 мкл гексанового экстракта соответствует детектированию 5, 10 и 20 нг зооцида.

Расчет результатов анализа при газовой хроматографии. Содержание зоокумарина в анализируемой пробе (X , мг/кг) находят по формуле:

$$X = \frac{C_k V_1}{V_2 P},$$

где C_k — количество вещества, найденное по градуировочному графику, нг; V_1 — объем экстракта, мл; V_2 — объем вводимого в испаритель хроматографа экстракта, мкл; P — масса анализируемой пробы, г.

Концентрация зоокумарина в мышечной ткани и крови животных при отравлении колеблется от 1,0 до 10,0 мг/кг.

Спектрофотометрическое определение зоокумарина в мышечной ткани и крови животных. Полученный после выпаривания остаток в фарфоровой чашке растворяют в 4 мл 2%-ного раствора гидроокиси натрия, фильтруют через бумажный фильтр в пробирку и измеряют оптическую плотность при 308 нм. Для сравнения используют пробу мышечной ткани или крови от того же вида здорового животного.

Спектрофотометрическое определение препарата пеноккумарина. Фильтрат 0,4 мл переносят в колбочку емкостью 50 мл и добавляют 9,6 мл 2%-ного раствора гидроокиси натрия. Раствор перемешивают и измеряют его оптическую плотность при длине волн 308 нм в кюветах с дли-

ной светового пути 1 см. В кювету для сравнения наливают 2%-ный раствор гидроокиси натрия.

Спектрофотометрическое определение зоокумарина в приманках (корме). Полученный после выпаривания остаток растворяют в 10 мл 2%-ного раствора гидроокиси натрия и фильтруют через бумажный фильтр в пробирку. Фильтрат 0,2 мл смешивают с 9,8 мл 2%-ного раствора гидроокиси натрия и измеряют оптическую плотность при 308 нм против «холостой» пробы.

Количество вещества измеряют по градуировочному графику, для построения которого в ряд пробирок емкостью 15 мл вносят 0,25; 0,5; 1,0 и 2,0 мл стандартного раствора натриевой соли зоокумарина (0,1 мг/мл), что соответствует 25, 50, 100 и 200 мкг зооцида. Затем добавляют 2%-ный раствор гидроокиси натрия до объема 10 мл и после перемешивания измеряют оптическую плотность растворов при 308 нм.

Расчет результатов анализа при спектрофотометрии. Концентрацию зоокумарина в образце (X , мг/кг) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{CV}{V_1P},$$

где C — содержание зоокумарина, найденное по градуировочному графику, мкг; V — общий объем раствора препарата, мл; V_1 — объем раствора, взятого для анализа, мл; P — масса анализируемого препарата, г.

Обработка результатов анализа. Формулы для расчета результатов анализа приведены в данном методическом указании ранее.

Отбор проб растительного материала на корню

| Максимальная величина поля или партии для отбора проб | Материал | Способ отбора проб* | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------|
| <i>Зерновые</i> | | | | | |
| 100 га | Злаковые на корню | Методы ОШ, 0,5 кг в точке | 3 кг | Зерно отделить, измельчить, тщательно перемешать и выделить средний образец | 0,25—0,50 |
| <i>Семена кормовых культур на корню</i> | | | | | |
| 100 га | Кукуруза | Методом СС, не менее 18 растений | Початки из 18 растений | Зерно отделить, измельчить и отвесить средний образец | 0,25—0,50 |
| 50 га | Боб кормовой | Методом ПД | 1000 бобов | То же | 0,5—1,0 |
| <i>Промышленные культуры</i> | | | | | |
| 50 га/30 т | Рапс, сурепица, горчица | Метод СС, 0,5 кг в точке | 3 кг | Семена вышелушить, измельчить, перемешать и отвесить средний образец | 0,25 |
| 50 га/30 т | Мак масличный | Метод СС, 0,5 кг в точке | 3 кг | То же | 0,25 |
| 50 га/30 т | Подсолнечник | Метод СС, по 5 корзинок в точке | 20—30 корзинок | » » | 0,25 |
| 20 га/30 т | Лен | Метод СС | 1 кг коробочек | » » | 0,25 |
| 20 га/30 т | Хмель | Метод ПД, взять несколько шишек | 0,30 кг шишек | Шишки измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,25 |
| 100 га | | | | | |

* В приложениях приняты следующие обозначения методов отбора проб: ПД — по диагонали; СС — по смежным сторонам поля; К — метод конверта; ПР — пробоотборником; ПУ — продуктов в упаковке; ОШ — отбор штук.

| Максимальная величина поля или партии для отбора проб | Материал | Способ отбора проб | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---|--|---|--|---|-------------------------------|
| 20 га | Табак | Метод СС, по 4 листка в точке | Около 20 (1 кг) листьев | Листья измельчить, перемешать и взять средний образец | 0,25 |
| <i>Зеленые корма</i> | | | | | |
| 100 га/100 т | Мелкосеменные, мотыльковые, стручковые, зерновые травы и другие растения, входящие в состав смесей | Метод ПД, срезать целые растения (10—15 штук через равные промежутки) | 5 кг | Общую пробу измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,5—1,0 |
| 100 га/100 т | Кукуруза, подсолнечник, кормовая капуста | Метод СС, срезать по 3 растения в каждой точке | 3 кг | Весь собранный материал измельчить, перемешать и выделить $\frac{1}{4}$ часть, которую снова измельчить, тщательно перемешать и выделить средний образец | 0,5—1,0 |
| <i>Корнеклубнеплоды</i> | | | | | |
| 50 га/100 т | Сахарная свекла | Метод ПД, не менее 15 целых растений | Не менее 15 растений, не менее 10 кг | Отделить листья от корней. Листья считать отдельной пробой. Корни вымыть, обсушить, почетвертовать. От каждого взять $\frac{1}{4}$ часть; четвертинки измельчить, перемешать и отвесить средний образец. Листья | Листья — 0,5 |

| Максимальная величина поля или партии для отбора проб | Материал | Способ отбора проб | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---|---|--|---|--|-------------------------------|
| 50 га/100 т | Кормовая свекла, брюква | Метод ПД, не менее 15 целых растений | Не менее 15 корней, не менее 3 кг | измельчить, перемешать и выделить средний образец Корни вымыть, обсушить, почетвертовать. От каждого взять $\frac{1}{4}$ часть, четвертинки измельчить, перемешать и отвесить средний образец | 0,5 |
| 50 га/100 т | Картофель | Метод ПД, с 15 точек взять около 50 гнезд выборочно | Не менее 3 кг | Клубни вымыть, обсушить, с каждого взять половину или четверть, измельчить и отвесить средний образец | 0,5 |
| <i>Овощные культуры</i> | | | | | |
| 2—5 га | Овощные корнеплоды (морковь, петрушка, сельдерей, столовая свекла, редис, редька и др.) | Метод ПД, корни, а для овощей, используемых в ранний период развития (петрушка, столовая свекла), целые растения | Крупные — 3 кг, мелкие — 1 кг, ранние — 0,25—0,5 кг | Отбросить несъедобные части растений, остатки материала вымыть, обсушить, крупные овощи почетвертовать и отбросить $\frac{3}{4}$. Пробу измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,5—0,25 |
| <i>Капустные овощные культуры</i> | | | | | |
| 20 га | Капуста белая, красная, савойская | Метод ПД, не менее 10 растений, не менее 4 кг | 4 кг | С каждого кочана взять $\frac{1}{4}$ часть. Перед измельчением четвертинок | 0,5 |

| Максимальная величина поля или партии для отбора проб | Материал | Способ отбора проб | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| 5—10 га | Капуста цветная | Метод ПД, не менее 10 растений, не менее 2 кг | 2 кг | срезать и отбросить поверхность предыдущего среза, отбросить несъедобные листья, измельчить и выделить средний образец Отбросить несъедобные части, остальное измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,25 |
| 5 га | Капуста кольраби | Метод ПД, не менее 10 растений, не менее 0,5 кг | 0,75 кг | Отбросить несъедобные части, остальное измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,5 |
| 5 га | Капуста брюссельская | Метод ПД, учитывая головки, растущие на разной высоте и разных частях растения, не менее 10 растений | Не менее 1 кг | Измельчить, перемешать, выделить средний образец | 0,25 |
| 5 га | Лиственные овощи (салат, шпинат, щавель) | Метод ПД, не менее 10 растений | Салат — 0,5 кг Щавель — 0,25 кг | Отбросить несъедобные части, растение вымыть, обчистить, измельчить и выделить средний образец | 0,25 |
| 5 га | Укроп | Метод ПД, только листья | 0,25 кг | Отбросить непригодные части, измельчить, перемешать и отвесить средний образец | 0,25 |

| Максимальная величина поля или партии для отбора проб | Материал | Способ отбора проб | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------|
| 5 га | Молодой укроп, укроп для посолки огурцов | Метод ПД, целые растения | 0,5 кг | Измельчить целые растения, перемешать и отвесить средний образец | 0,25 |
| <i>Луковичные растения</i> | | | | | |
| 10 га | Лук, чеснок, лук-порей | Метод ПД, в полной зрелости | Лук, лук-порей — 1 кг, чеснок — 0,5 кг | Отбросить несъедобные части, растения измельчить, перемешать и отвесить средний образец. Для лука и лука-порея с каждой штуки взять половину | 0,25 |
| 5 га | Лук-резанец, лук-батун, лук-порей в ранней стадии развития | Метод ПД, целые растения | Лук, лук-порей — 0,5—1 кг, лук-резанец, лук-батун — 0,25 кг | То же | 0,25 |
| 5 га | Бобовые овощи (фасоль, горох, боб) | То же | 0,5—1 кг бобов | Семена выделить, измельчить и выделить средний образец | 0,5 |
| 50 га | Фасоль «зеленый боб» | » » | 0,5 кг | Целые бобы измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,5 |
| 20 га/30 т | Помидоры, перец | » » | Мелкие овощи — 0,5—2 кг, крупные овощи — 2 кг | Овощи вымыть, измельчить и выделить средний образец | 0,5 |

| Максимальная величина поля или партии для отбора проб | Материал | Способ отбора проб | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца |
|---|---------------------------|--|---|--|---------------------------|
| 20 га/500 т | Огурец и бахчевые | То же | 10 овощей, из крупных бахчевых взять вырезки — масса пробы 0,5 — 3 кг | Овощи вымыть, измельчить и выделить средний образец. Из крупных бахчевых взять вырезки | 0,5 |
| 5 га | Спаржа | » » | 0,5 кг | Растения вымыть, измельчить и выделить средний образец | 0,25—0,5 |
| 5 га | Ревень | Метод ПД, выборочно листья | 2 кг (без листовых пластинок) | После удаления листовых пластинок растения вымыть, высушить и выделить средний образец | 0,5 |
| <i>Грибы</i> | | | | | |
| — | Шампиньоны и другие грибы | Метод К, руководствуясь правилами сбора грибов | Не менее 0,5 кг | Грибы измельчить, перемешать и отвесить средний образец | 0,5 |
| <i>Фрукты</i> | | | | | |
| 200 га/500 т | Семечковые фрукты | До 30 деревьев — выборочно, свыше 30 деревьев — метод ПД, в зависимости от площади, с 20—30 деревьев. Фрукты следует снимать с разных сторон дерева, с разной высоты и глубины кроны | До 30 деревьев — 5 кг, до 1 га — 7 кг, 1—10 га — 10 кг, 10—30 га — 12 кг, свыше 30 га — 15 кг | Фрукты почтветрбовать, от каждого плода взять $\frac{1}{4}$ часть, четвертинки измельчить, перемешать и отвесить средний образец | 0,5 |

| Максимальная величина поля или партии для отбора проб | Материал | Способ отбора проб | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---|---|--|--|--|-------------------------------|
| До 200 га/200 т | Косточковые фрукты (персики, абрикосы, сливы) | До 30 деревьев — выборочно, свыше 30 деревьев — метод ПД с 15—20 деревьев | До 30 деревьев 4 кг, до 1 га — 6 кг, свыше 1 га — 8 кг | Плоды поделить пополам, от каждого взять половину без косточки, измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,5 |
| До 200 га/100 т | Вишни, черешни, сливы | То же | До 30 деревьев — 1,5 кг, до 1 га — 2 кг, свыше 1 га — 2,5 кг | Косточки удалить, плоды измельчить, перемешать и отвесить средний образец | 0,5 |
| | Орехи (грецкие, лещина) | » » | До 30 растений 1 кг, свыше 30 — 1,5 кг | Из орехов вынуть ядра, измельчить их, перемешать и отвесить средний образец | 0,25—0,5 |
| 10 га | Ягоды (смородина, крыжовник*) | До 30 кустов пробу взять с каждого куста с разной его стороны и глубины, свыше 30 кустов — метод СС с 25—35 кустов | До 30 кустов — не менее 1 кг*, свыше 30 кустов — не менее 1,5 кг | Из тщательно перемешанного исходного образца взять половину, измельчить ее, перемешать и отвесить средний образец | 0,5 |
| До 200 га | Виноград | Метод СС, боковые части кистей | 1,5 кг | Взять отделенные от основания боковые части кистей, тщательно перемешать исходный образец и взять половину, измельчить ее, перемешать и отвесить средний образец | 0,5 |

| | | | | | |
|---------|---|----------|---|---|-----|
| До 1 га | Мягкие фрукты (клубника, земляника, малина) | Метод ПД | До 500 м ² — 1,5 кг, 500 м ² — 0,25 га — 2,5 кг, свыше 0,25 га — 2,5 кг | Тщательно перемешать исходный образец, взять половину, измельчить ее, перемешать и отвесить средний образец | 0,5 |
|---------|---|----------|---|---|-----|

* Для крыжовника с крупными плодами проба должна быть не менее 1,5 кг.

Приложение 2

Отбор проб мяса и внутренних органов убойных животных и проб рыбы

| Материал | Способ отбора | Величина средней пробы или исходного образца | Проба | Величина среднего образца, кг |
|-----------------------|---|--|---|-------------------------------|
| Рогатый скот и свиньи | Выборочно от 3 животных при партии 100 голов, от 5 животных при партии 100—200 голов, от 7 животных при партии 200—500 голов, от 10 животных при партии более 500 голов. Берут пробы жира, мышц, внутренних органов | От каждой туши по 0,2—0,5 кг | Каждый исходный образец составляет исходную пробу | 0,2—0,5 |
| Овцы | То же | От каждой туши по 0,1—0,2 кг | То же | 0,2—0,5 |
| Домашние птицы | » » | От каждой тушки по 50 г | » » | 0,1—0,3 |
| Дичь | » » | С оленей 200 г, с кабанов и косуль 100 г, с зайцев 20 г, с беляков 5 г | » » | 0,1—0,3 |

| Материал | Способ отбора | Величина средней пробы или исходного образца | Проба | Величина среднего образца, кг |
|----------|---|--|--|-------------------------------|
| Яйца | В хозяйстве в ареале отбора проб берется по 10 и 20 яиц с определенных пунктов скупа. На птицефабриках — по 5 яиц из каждой партии | 20 яиц | Каждый исходный образец составляет средний образец | 20 яиц |
| Молоко | Со сливного пункта 500 мл. От коров в определенном хозяйстве по 100 мл молока | 500 мл | То же | 0,5 |
| Рыба | При массе рыбы менее 0,1 кг берут пробу от нескольких рыб массой 0,5 кг, перемешивают и отбирают среднюю пробу. При массе рыбой 0,1—1 кг отбирают целые экземпляры. При массе 1—2 кг берут одну продольную часть половины рыбы. При массе свыше 2 кг вырезают образец со средней части рыбы 100—200 г | 0,5 кг | Среднюю пробу принимают за средний образец | 0,5 |
| Икра | От одной партии берут три образца по 100 г с каждой бочки (ящика) | 0,1 кг | То же | 0,1 |

Отбор проб материалов со складов, баз, хранилищ, транспортных средств

| Максимальная величина для отбора проб | Материал | Способ отбора проб | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---------------------------------------|--|---|--|---|-------------------------------|
| <i>Зерно, жмыхи, шрот</i> | | | | | |
| 100 т | Зерно, жмыхи и шрот из плоских хранилищ | В каждом сегменте поверхности около 100 м ² брать пробу методом К с трех слоев | 10 кг | Зерно измельчить, тщательно перемешать и выделить средний образец | 1,0 |
| 100 т | Зерно, жмыхи и шрот из средств транспорта | С каждого транспортного средства отдельно брать пробу методом К с трех слоев, с четырехосных вагонов — методом К × 2, с барок — К × 3 | 10 кг | То же | 1,0 |
| 100 т | Зерно, жмыхи и шрот из закрытых трюмов судов и цистерн | Из столько отверстий, сколько имеется в данной таре, с трех слоев или методом ПР во время перегрузки | 10 кг | » » | 1,0 |
| 100 т | Зерно, жмыхи и шрот в мешках | Методом ПР с разных мест отдельных мешков | 7 кг | » » | 0,5—1,0 |
| 100 т | Зерно, жмыхи и шрот во время перегрузки | Методом ПР из струи в равных интервалах | 7 кг | » » | 0,5—1,0 |
| 100 т | Силос, свекловичный жом, пульпа, отвалы | Метод ПР при удалении верхнего слоя на глубине 30 см | 2 л | Перемешать и выделить средний образец | 0,25 |

| Максимальная величина для отбора проб | Материал | Способ отбора проб | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---------------------------------------|----------|--------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
|---------------------------------------|----------|--------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|

Материал в кусках (картофель, свекла и т. д.)

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|------|---|---------|
| 100 т | В хранилищах | Метод ПР, с верхнего, среднего и нижнего слоев | 7 кг | Материал почетвертовать, взять $\frac{1}{4}$ часть, перемешать, измельчить и выделить средний образец | 0,5—1,0 |
| Одно средство транспорта | В средствах транспорта | Метод ПР, с верхнего, среднего и нижнего слоев | 3 кг | То же | 0,5—1,0 |

Соломоподобный материал

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|----------|
| До 100 т | Непрессованный | Метод ПР, на расстоянии 50 см от верха и низа из 20 мест | 2 кг | Измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,1—0,2 |
| До 100 т | Прессованный | Метод ПР, из тюков после снятия с них проволоки. Брать горстью с трех разных мест, стараясь не ломать растений | 2 кг | То же | 0,1—0,2 |
| | Фрукты и овощи свежие | Метод ОШ, из различных упаковок, ящиков и т. д. из разных слоев | Из упаковок | Как в приложении 1, овощные культуры и фрукты | 0,5—0,25 |
| | Яблоки, груши, персики, айва | То же | 10 кг (не менее 100 шт.) | Как в приложении 1, семечковые фрукты | 0,5 |
| | Абрикосы, сливы | » » | 4 кг (не менее 100 шт.) | Как в приложении 1, вишни, черешни, сливы | 0,5—0,25 |
| | Черешня, вишня, виноград, земляника | » » | 4 кг | Как в приложении 1, вишни, черешни, сливы, виноград | 0,5—0,25 |

| Максимальная величина для отбора проб | Материал | Способ отбора проб | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---------------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------|
| | Крыжовник, смородина, малина | Метод ОШ, из различных упаковок, ящиков и т. д. из разных слоев | 3 кг | Как в приложении 1, ягоды | 0,5—0,25 |
| | Садовая земляника и другие лесные ягоды | То же | 2 кг | Как в приложении 1, мягкие фрукты | 0,5—0,25 |
| | Огурцы, капуста кольраби, корнеплоды, перец, редис, помидоры | » » | 3 кг | Как в приложении 1, помидоры, перец, огурец и бахчевые | 0,5 |
| | Капуста белокочанная, краснокочанная, цветная, салат | » » | 10 кочанов | Как в приложении 1, капустные и листовые овощи | 0,5 |
| | Молодая кукуруза | » » | 10 початков | Как в приложении 1, кукуруза | 0,25—0,5 |
| | Овощи в пучках | » » | 10 пучков | Как в приложении 1, овощные культуры | |
| | Бахчевые | » » | 5 штук | — | |
| | Другие овощи | » » | 1 кг | Как в приложении 1, овощные культуры | 0,25—0,5 |

Овощи и фрукты сушеные

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|--------|---|------|
| 600 упаковок | Овощи и фрукты в виде кусочков | Метод ПР, с трех слоев | 1—3 кг | Кусочки или брикеты измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,5 |
| | Овощи и фрукты в виде порошка и сушеной зелени | | 0,6 кг | То же | 0,25 |

| Максимальная величина для отбора проб | Материал | Способ отбора проб | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| | Овощи и фрукты в брикетированном виде | Метод ВС, брикеты массой более 1 кг — отрезать сектор 1—2 см от краев, брикеты массой менее 1 кг — по одному брикету | 1—3 кг | Кусочки или брикеты измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,25 |
| <i>Пищевые продукты в жидкой форме</i> | | | | | |
| | В крупной таре (контейнеры, цистерны, баки, бочки и т. д.) | Метод ПР, тара высотой до 2 м — полный слой, тара выше 2 м — с трех уровней | 2 л | Разовые пробы сливают, перемешивают, выделяют среднюю пробу и средний образец | 0,25 |
| | В мелкой таре (фляги, бутылки, банки) | Метод ПУ | 2 л | Исходные образцы сливают, перемешивают, выделяют среднюю пробу и средний образец | 0,25 |
| | Во время перегрузки | Метод ПР, с разных мест отдельных мешков | 2 л | То же | 0,25 |
| <i>Пищевые продукты мажеобразной и твердой консистенции</i> | | | | | |
| | В крупной таре | Метод ПР, тара высотой до 2 м — полный слой, тара выше 2 м — с трех уровней | 0,5—2 кг | Разовые пробы сливают, перемешивают, выделяют среднюю пробу и средний образец, при этом исходные образцы материала твердой консистенции измельчаются | 0,25 |
| | В мелкой таре | Метод ПУ | 0,2—1 кг | Исходные образцы объединяют, перемешивают, выделяют среднюю пробу и средний образец | 0,2 |

| Максимальная величина для отбора проб | Материал | Способ отбора проб | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---------------------------------------|----------|--------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
|---------------------------------------|----------|--------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|

Пищевые продукты в упаковке (консервы, товар в бумажной или пластмассовой упаковке, в мешках и т. д.)

| | | | | |
|--|----------|---------------------------|--|----------|
| Сгущенное молоко, джем, повидло и др. | Метод ПУ | 1 банку от варки или 2 кг | В случае взятия 1 банки она составляет средний образец, в других случаях перемешать и выделить средний образец | 0,5—1 |
| Мясные консервы | То же | 1 кг | Измельчить, перемешать и выделить средний образец | 0,5 |
| Другие товары (мука, крупа, чай, кофе и др.) | » » | 1 кг | Удалить упаковки, перемешать, если нужно, измельчить и выделить средний образец | 0,25—0,5 |

Продукты в кусках без упаковки

| | | | | |
|--|----------|-------------|--|----------|
| Мясопродукты (ветчина, бекон, сало, колбаса и др.) | Метод ПР | 0,5 кг | Отрезать исходные образцы массой 10 г с разных единиц продукции, измельчить и перемешать, средняя проба составляет средний образец | 0,5 |
| Сосиски и сардельки | Метод ОШ | 0,4—0,5 кг | Отделить как исходные образцы сосиски и сардельки, не нарушая их целостности | 0,4—0,5 |
| Твердый сыр | Метод ПР | 0,05—0,1 кг | Исходные образцы измельчить, перемешать, они составляют средний образец | 0,05—0,1 |

| Максимальная величина для отбора проб | Материал | Способ отбора проб | Величина средней пробы или исходного образца | Подготовка среднего образца | Величина среднего образца, кг |
|---------------------------------------|----------|--------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
|---------------------------------------|----------|--------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|

Молоко

| | | | | |
|--------------------|---|--------|--|--------|
| Со сливного пункта | Из цистерн (танков) 3 пробы с разной глубины по 100 мл. Из струи 3 пробы с интервалом в несколько минут | 100 мл | Каждая средняя проба является средним образцом | 300 мл |
| С молочных ферм | От 10 выбранных коров в определенном хозяйстве по 100 мл | 1,0 л | То же | 0,5 л |
| Из торговой сети | Методом ОШ, бутылки или другая упаковка | 1,0 л | » » | 0,5 л |

Молочные напитки (сметана, йогурт и т. п.)

| | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|--|----------|
| С молокозавода и из торговой сети | Из цистерн (танков) 3 пробы с разной глубины. Из упаковок методом ОШ | 100 мл | Каждая средняя проба является средним образцом | 300 мл |
| Масло | Методом ПР или ПУ | 0,5—2 кг | Разовые пробы смешать и выделить средний образец | 0,2—0,25 |

Сыры

| | | | | |
|--------------|------------|-------------|---|----------|
| Твердые сыры | Методом ПР | 0,05—0,1 кг | Средние пробы измельчить и перемешать, это составит средний образец | 0,05—0,1 |
| Мягкие сыры | То же | 0,5—2 кг | Разовые пробы смешать и выделить средний образец | 0,2—0,25 |
| В упаковке | Методом ОШ | 0,5 кг | То же | 0,2 |

Отбор проб лекарственных и ароматических растений*

| Материал | Величина средней пробы или исходного образца, г | Величина среднего образца, г |
|--|---|------------------------------|
| Почки березовые | 150 | 50 |
| Почки сосновые | 350 | 100 |
| Листья цельные | 400 | 100 |
| Листья сены, толокнянки, брусники | 150 | 50 |
| Листья разные | 200 | 50 |
| Цветки | 300 | 100 |
| Цветки коровяка, крапивы глухой, ландыша, полыни цитварной, ноготков, кукурузные столбики с рыльцами | 150 | 50 |
| Цветки бузины черной | 75 | 50 |
| Цветки ромашки аптечной | 200 | 100 |
| Цветки ромашки долматской | 400 | 200 |
| Травы целые | 600 | 250 |
| Травы донника, душицы, тимьяна, анабазиса | 150 | 50 |
| Травы полыни | 100 | 50 |
| Травы резаные | 200 | 75 |
| Сочные плоды | 200 | 100 |
| Плод малины, шиповника | 300 | 150 |
| Плод стручкового перца | 500 | 100 |
| Сухие семена дурмана индийского, термописа | 250 | 50 |

*Пробы отбирают методом ПР. При подготовке среднего образца отделяют половину массы, измельчают и перемешивают ее, а затем выделяют средний образец.

| Материал | Величина средней пробы или исходного образца, г | Величина среднего образца, г |
|--|---|------------------------------|
| Корни, корневища целые | Масса 1 шт. | 100 |
| Корень истода, корневище и корень марены, корень мыльный красный | 400 | 100 |
| Корни валерианы | 400 | 100 |
| Корень девежисила, корневище папоротника и корень ревеня | 1300 | 250 |
| Корень солодки очищенный | 2200 | 250 |
| Корень барбариса | 5200 | 500 |
| Корни и корневища резаные | 200 | 100 |
| Кора целая | 650 | 250 |
| Кожа резаная | 200 | 100 |
| Прочее растительное сырье: | | |
| пиретрум (порошок) | 100 | 100 |
| мох дубовый и исландский | 150 | 100 |
| ликоподит | 150 | 50 |
| губка листовная | 550 | 250 |
| рожки спорыньи | 150 | 50 |
| березовый гриб (чага) | 3000 | 500 |
| морская капуста | 5000 | 500 |
| в т. ч.: | | |
| шинкованная | 1000 | 500 |
| порошок | 400 | 100 |
| Бодяга | 150 | 150 |

Выписка из перечня «Допустимые остаточные количества пестицидов в пищевых продуктах» и дополнения к нему, утвержденные Минздравом СССР 24.03 1977 г. № 1735—77, 24.08 1979 г. № 2052—79 и 21.04 1981 г. № 2390—81

| Пестицид | Продукт | Допустимые остаточные количества (ДОК), мг/кг |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Абат | Сахарная свекла, овощи, цитрусовые хлопковое масло | 0,3 |
| Афуган | Продукты питания | Не допускается |
| Амидофос | Молоко и молочные продукты Мясо и мясные продукты | Не допускается 0,3 |
| Агелон | Кукуруза | 0,2 |
| Акрекс | Огурцы, яблоки, цитрусовые | 0,05 |
| Амибен | Капуста, томаты | 0,25 |
| Амифос | Сахарная свекла Остальные продукты растительного происхождения | 0,1 0,3 |
| Антио | Яблоки, груши, сливы, цитрусовые, виноград, капуста и другие овощи | 0,2 |
| Арезин | Картофель | 0,1 |
| Атразин | Зерновые, фрукты, овощи Мясо, яйца Молоко | 0,1 0,02 Не допускается |
| Байялан | Зерновые | 0,2 |
| Базудин | Капуста, лук, картофель Томаты, свекла, огурцы Зерно Жир мясной | 0,1 0,5 1,0 0,7 |
| Анилат 93%-ный | Морковь, молоко, молоч. продукты | Не допускается |
| Байлетон | Пшеница (зерно) | 1,0 |
| Бромофос | Огурцы, томаты (закрытый грунт) Яблоки Виноград Ягоды (смородина, малина) Косточковые (персики, черешня) Овощи: капуста, фасоль, огурцы, салат, горошек Хмель | 0,5 0,1 0,05 0,02 0,07 0,05 0,5 |
| Бенлат | Сахарная свекла, пшеница | 1,0 |
| Беганал | Свекла | 0,2 |
| Бромтан | Овощи, бахчевые | 3,0 |
| Бордоская жидкость | Фрукты, овощи Мясо, яйцо | 5,0 2,0 |
| Валексон | Зерно | 0,6 |
| Гардона | Семечковые, косточковые, хмель, капуста | 0,8 |
| Гамма-изомер гексахлорциклогексана (линдан) | Ягоды Картофель, горох, зерновые Масло сливочное, жир Рыба Молоко, молочные продукты, мясо (мышечная ткань), яйца, сахар | 0,01 0,5 0,2 0,2 0,005 |

| Пестицид | Продукт | Допустимые остаточные количества (ДОК) мг/кг |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Гексахлоран (сумма изомеров) | Картофель и овощи Зерновые Масло сливочное, жир Рыба Молоко, молочные продукты, мясо яйца, сахар | 0,5 0,2 0,2 0,2 0,005 |
| Гексахлорбутadiен | Виноград, виноградное вино Виноградный сок | 0,01 Не допускается |
| Гексахлорбензол | Зерно (пшеница) | 0,01 |
| Гербициды группы 2,4-Д | Все пищевые продукты | Не допускается |
| Гептахлор | Все пищевые продукты | Не допускается |
| Гербан | Растительные пищевые продукты | 0,1 |
| Гидрел | Черешня, яблоки, мандарины, огурцы | 0,15 |
| Далапон | Фрукты, виноград, овощи | 1,0 |
| Дактал | Растительные пищевые продукты | 3,0 |
| ДДВФ | Мука, крупа, молоко, мясо Отруби, зерно | Не допускается 0,3 |
| ДДТ и его метаболиты (применение препарата в сельском хозяйстве запрещено) | Косточковые, семечковые, ягоды, виноград | 0,05 |
| | Фрукты, овощи, картофель | 0,1 |
| | Рыба | 0,2 |
| | Рыбные консервы | (временнo) 0,2 |
| | Зерновые | (временнo) 0,02 |
| | Молоко, молочные продукты детского и диетического питания, мясо, яйца, ягоды, сахар | 0,005 (временнo) |
| | Продукты переработки молока (творог, сметана, сливки, масло) | 1,25 мг/кг в пересчете на жир (норма рекомендации СЭВ) |
| ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) | Табак и табачные изделия | 0,7 |
| Дилор | Виноград, картофель Томаты и другие овощи, сахарная свекла | 0,15 0,2 |
| Дифос | Молоко | 0 |
| Дибром | Мясо, яйца | 1,0 |
| | Мясо | 0,3 |
| Диурон | Картофель | 0,2 |
| | Другие овощи | 0,1 |
| Дикрезил | Молоко и продукты его переработки | 0 |
| Дикотекс (метаксон) | Хлопковое масло | 0,05 |
| Динитроортокрезол | Молоко, молочные продукты, яйца | Не допускается |
| Дифенамид | Зерно | 0,05 |
| Дихлоральмочевина | Все пищевые продукты | Не допускается |
| | Овощи | 0,15 |
| Дихлорэтан | Все пищевые продукты | Не допускается |
| | Зерно | 7,0 |
| Дитан М-45 | Мука | 5,0 |
| | Картофель | 0,1 |

| Пестицид | Продукт | Допустимые остаточные количества (ДОК), мг/кг |
|------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Динитророданбензол | Виноград, томаты | 1,0 |
| | Овощи, фрукты, виноград | 0,2 |
| Дозанекс | Овощи, зерновые | 0,1 |
| Изофос | Рис | 0,1 |
| Зенкор | Картофель, томаты | 0,25 |
| Каптан | Косточковые, семечковые, виноград, овощи | 0,35 |
| | Семечковые, виноград | 0,1 |
| Карагард | Бахчевые, яблоки, груши, огурцы | 1,0 |
| Каратан | Ягоды | Не допускается |
| Карбин | Овощи, фрукты | 0,1 |
| | Зерновые | 1,0 |
| Карбофос | Овощи, фрукты и другие растительные продукты | 1,0 |
| | Мука | 2,0 |
| | Зерно | 3,0 |
| | Крупа (кроме манной) | 1,0 |
| | Хлеб | 1,0 |
| | Зернобобовые | 3,0 |
| | Зерно (пшеница, кукуруза) | 0,2 |
| | Фрукты | 0,6 |
| | Фрукты, овощи | 1,0 |
| | Хлопковое масло | Не допускается |
| Кротонлактон сырец | Хлопковое масло | 0,1 |
| | Хлопковое масло | Не допускается |
| Карпен | Молоко, молочные продукты, яйца | 0,2 |
| Кельтан | Мясо, мясопродукты | 0,2 |
| Котофор | Овощи, фрукты, виноград, бахчевые | 5,0 |
| Которан | Зерновые | 1,0 |
| Корал | Виноград | 4,0 |
| | Яблоки, груши | 2,0 |
| Купрозан | Яблоки, груши | 2,0 |
| | Мясо | 0,4 |
| Купронафт | Мясо | 0,4 |
| Кремнефтористый натрий | Мясо | 0,4 |
| Ленацил | Столовая свекла | 0,5 |
| Линурон | Картофель, бобовые, кукуруза | 0,1 |
| | Морковь | 0,05 |
| МГ-натрий | Картофель, корнеплоды, лук | 14,0 |
| Медный купорос | Фрукты | 5,0 |
| Мезоранил | Овощи | 0,2 |
| Метилнитрофос | Цитрусовые | 0,1 |
| | Зерно | 0,1 |
| | Хлеб | 0,1 |
| | Мука | 0,3 |
| | Овощи, фрукты | 0,7 |
| | Все пищевые продукты | Не допускается |
| Метальдегид | Овощи, фрукты, виноград, бахчевые | 0,5 |
| | Зерно | (по цинебу) 1,0 |
| | Зерно | (по цинебу) 1,0 |
| Метифос | Все пищевые продукты | Не допускается |
| Мильтокс-специаль | Овощи, фрукты, виноград, бахчевые | 0,5 |
| | Зерно | (по цинебу) 1,0 |
| Метоксихлор | Все пищевые продукты | 14,0 |
| Монурон | Семечковые, виноград, цитрусовые, овощи | 0,05 |
| | Фрукты, цитрусовые | 0,002 |
| Морестан | Семечковые, виноград | Не допускается |

| Пестицид | Продукт | Допустимые остаточные количества (ДОК), мг/кг |
|---------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Метазин | Картофель | 0,05 |
| 2М-4ХМ | Зерновые | 0,1 |
| 2М-4ХП | Зерновые | 0,25 |
| Неорон | Хлопковое масло, шрот | 0,02 |
| Нитрафен | Все пищевые продукты | Не допускается |
| Нитрохлор | Капуста | 0,1 |
| Пентахлорнитробензол | Зерновые | 1,0 |
| | Хлопчатник (семена) | 0,03 |
| Полимарцин | Яблоки, виноград, томаты, картофель | 0,1 |
| Поликарбацин | Овощи, фрукты, ягоды | 1,0 |
| Полихлоркамфен | Картофель, сахарная свекла | 0,1 |
| | Зеленый горошек, сахар, молоко, мясо, яйцо | Не допускается |
| Полихлорпинен | Картофель, сахарная свекла, горох, сахар, молоко, мясо, яйцо | Не допускается |
| Препарат 242 | Мука | Не допускается |
| Пропанид | Зерно сырое | 2,0 |
| Пропазин | Рис | 0,3 |
| | Зернобобовые | 0,2 |
| | Морковь | Не допускается |
| Пиримор | Яблоки, персики | Не допускается |
| Прометрин | Овощи, картофель | 0,1 |
| | Морковь | Не допускается |
| Реглон | Растительное масло | 0,1* |
| Ронит | Сахарная и столовая свекла | 0,3 |
| Ртутьсодержащие пестициды | Все пищевые продукты | Не допускается (учитывается естественное содержание ртути в печени животных не более 0,03 мг/кг и почках не более 0,05 мг/кг) |
| Сайфос | Овощи, картофель, сахарная свекла, бахчевые бобовые, семечковые и другие фрукты | 1,0 |
| Севин | Плоды, ягоды, кукуруза, семена хлопчатника | Не допускается |
| Семерон | Капуста | 0,05 |
| Сероуглерод | Зерно | 10,0 |
| | Мука, крупа | 1,0 |
| | Хлеб и другие продукты, изготовленные из зерновых | 0,006 |
| Симазин | Фрукты | 0,2 |
| | Виноград | 0,05 |
| | Зерновые | 1,0 |
| Солан | Томаты | 1,5 |
| Тедион | Овощи, фрукты | 0,7 |
| Тордон 22К | Кукуруза | Не допускается |

* Расчетные нормативы.

| Пестицид | Продукт | Допустимые остаточные количества (ДОК), мг/кг |
|--------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Трефлан | Грибы, лесные ягоды | 0,5 |
| Теноран | Лук, морковь, капуста | 0,5 |
| Тербацил | Морковь | 0,02 |
| Тиазон | Яблоки, citrusовые, виноград, персики | 0,05 |
| Тиллам | Картофель, огурцы и другие овощи, рыба | 0,5 |
| ТМТД | Овощи, томаты, сахарная и столовая свекла | 0,05 |
| Трихлорметафос-3 | Все пищевые продукты | Не допускается |
| Трихотецин | Фрукты, овощи | 1,0 |
| Трихлорацетат натрия | Зерно | 0,5 |
| Тролен | Огурцы | 1,0 |
| Топсин-М | Овощи, фрукты, зерно | 0,01 |
| Фозалон | Мясо, мясопродукты | 0,3 |
| Фосфамид | Яблоки, груши, вишни, персики, виноград | 1,0 |
| Фталан | Семечковые, косточковые, виноград, citrusовые, зерновые, картофель | 0,2 |
| Фталофос | Фрукты, citrusовые, картофель, овощи, зерновые | 1,0 |
| Фостоксин | Семечковые, косточковые, виноград, овощи, картофель | 2,0 |
| Фенурон | Сахарная свекла | 0,25 |
| Хлорофос | Картофель | Не допускается |
| Хлорхолинхлорид | Зерно | 0,01 (по фосфористому водороду) |
| Хлор ИФК | Грибы, лесные ягоды | 1,0 |
| Цидиал | Зелень, фрукты, капуста | 0,1 |
| Циодрин | Другие овощи | 0,2 |
| Цианокс | Мясо, молоко и молочные продукты | Не допускается |
| Четыреххлористый углерод | Овощи, фрукты | 0,05 |
| Эптам | Зерно | 0,1 |
| Ялан | Морковь | 0,05 |
| | Семечковые, виноград, citrusовые | 0,1 |
| | Молоко, молочные продукты | Не допускается |
| | Мясо | 0,005 |
| | Виноград, яблоки | 0,1 |
| | Зерновые | 50,0 |
| | Мука, крупа | 10,0 |
| | Хлеб и другие продукты, изготовленные из зерновых | 0,05 |
| | Свекла | 0,05 |
| | Рис | 0,2 |

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАЗВАНИЙ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СПРАВОЧНИКЕ

- АрмФилВНИИГИНТОКС — Армянский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института гигиены и токсикологии пестицидов, полимерных и пластических масс (Ереван).
- БелНИСГИ — Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт (Минск).
- ВИЗР — Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты растений (Ленинград).
- ВИЛАР — Всесоюзный научно-исследовательский институт лекарственных растений (Москва).
- ВИЭВ — Всесоюзный институт экспериментальной ветеринарии (Москва).
- ВНИВО — Всесоюзный научно-исследовательский институт по охране вод (Харьков).
- ВНИИбакпрепарат — Всесоюзный научно-исследовательский институт микробиологических средств защиты растений и бактериальных препаратов (Москва).
- ВНИИ биометодов — Всесоюзный научно-исследовательский институт биологических методов защиты растений (Кишинев).
- ВНИИВС — Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии (Москва).
- ВНИИВЭА — Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии (Тюмень).
- ВНИИГИНТОКС — Всесоюзный научно-исследовательский институт гигиены и токсикологии пестицидов, полимерных и пластических масс (Киев).
- ВНИИ жиров — Всесоюзный научно-исследовательский институт жиров (Ленинград).
- ВНИИМП — Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности (Москва).
- ВНИИПП — Всесоюзный научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности (Москва).
- ВНИИ фитопатологии — Всесоюзный научно-исследовательский институт фитопатологии (Голицыно Московской области).
- ВНИИХСЗР — Всесоюзный научно-исследовательский институт химических средств защиты растений (Москва).
- ВНИМИ — Всесоюзный научно-исследовательский институт молочной промышленности (Москва).
- ВНИТИГ — Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений (Уфа).
- ВНИФС — Всесоюзная научно-исследовательская противифиллоксерная станция (Одесса).
- ГрузНИИЗР — Грузинский научно-исследовательский институт защиты растений (Тбилиси).
- Институт коллоидной химии и химии воды АН УССР (Киев).
- ИЭМ — Институт экспериментальной метеорологии (Обнинск).
- КНИИГТиПЗ — Киевский научно-исследовательский институт гигиены труда и профзаболеваний (Киев).
- МТИММП — Московский технологический институт мясной и молочной промышленности (Москва).
- УкраИЗР — Украинский научно-исследовательский институт защиты растений (Киев).
- УкраНИИЭВ — Украинский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии (Харьков).

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Аатрекс. См. *атразин*
Абат (дифос) 77, 123
Азиадотрион. См. *сайфос*
Азипротрин. См. *мезоранил*
Азунтол. См. *корал*
Альдрин 7, 9, 37
Амибен 167
Амифос 57
Амобен. См. *амибен*
Антно 57, 63, 64, 117, 123
Арезин 139, 142
Арохлор 10
Аслон. См. *линурон*
Атразин 215
Афолан. См. *линурон*
Афекс. См. *сайфос*
Афуган 57, 124
- Базудин (диазинон) 57, 72
Байгон. См. *пропаксур*
Байер 21/199. См. *корал*
Байер 39007. См. *пропаксур*
Байтекс 123
Байтрион. См. *фоксил*
БАС-235001; 235041; 235051. См. *фенеткарб*
Бенсулид. См. *префар*
Бетазон. См. *префар*
Бетанал 148
Бладекс. См. *симазин*
Блаттанекс. См. *пропаксур*
Больфо. См. *пропаксур*
Брасоран. См. *мезоранил*
Бромофос 57, 66
- Валексон. См. *фоксим*
Варбекс 69
Вегибен. См. *амибен*
Видекс. См. *симазин*
Витамицин А 255, 256
Волатон. См. *фоксим*
ВФ-293. См. *кельтан*
- Г-27692. См. *симазин*
Г-30027. См. *атразин*
Г-30028. См. *пропазин*
Г-34161. См. *прометрин*
Г-34360. См. *семерон*
Г-36393. См. *метопротрин*
Газатон. См. *симазин*
Гардона 57, 72
Гардоприм (хлоркарагард) 216, 223
Гарнитан. См. *линурон*
ГАС-893. См. *дактал*
- Гажнон 131
Гезагард. См. *прометрин*
Гезамил. См. *пропазин*
Гезаприм. См. *атразин*
Гезаран. См. *метопротрин*
Гексахлоран (ГХЦГ) 22, 36, 79
Гексахлорбензол 6, 7, 9, 170
Гексахлорбутадиен (ГХБД) 21, 22
Гептахлор 13, 16, 29, 30, 32, 34, 36
Гербицид 6602. См. *дозанекс*
Гетерофос 70
Гомелин 251
Гранозан 239
ГС-13529. См. *хлоркарагард*
ГС-14259. См. *метоксикарагард*
Альфа-ГХЦГ 5, 7, 9, 13, 16, 17, 29, 32
Гамма-ГХЦГ 6, 7, 9, 13, 16, 17, 18, 29, 32, 33, 34
- 2,4-Д 176, 182, 187, 193
2,4-Д бензиловый эфир 190
2,4-Д полнэтилентгликолевый эфир 187
Дактал 35, 169
Далалон 170
ДДВФ 73, 75, 123
п, п'-ДДД 5, 7, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 29, 30, 32, 34, 37
о, п'-ДДТ 5, 7, 9, 13, 17,
п, п'-ДДТ 5, 7, 9, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 79
п, п'-ДДЭ 6, 7, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 29, 30, 32, 34, 37
Дервикол. См. *дервинол*
Дервинол 210
Десметрин. См. *семерон*
Деспероль 22
Диазинон. См. *базудин*
Дибром 75, 123
Дигидрогептахлор. См. *дилор*
Дикураан 133
Дикурон 139
Дилор 24
Дилокс. См. *хлорофос*
Димид. См. *дифенамид*
Диптерекс. См. *хлорофос*
Дифенамид 174
Дифос. См. *абат*
Диурон 139
3,4-дихлоранилин 161
Дихлорфос. См. *ДДВФ*
2,4-дихлорфеноксимасляная кислота 193
2,4-ДМ 193

- Дозанекс 135
 Зоокумарин 227
 Игран 215
 Изофос-3 78
 Канехлор 10
 Капарол. См. *прометрин*
 Карагард 215
 Карахол. См. *суффикс*
 Карбарил. См. *севин*
 Карбафос 57, 72, 81, 83, 85, 123
 Касарон 203
 Кельван. См. *деспиrolь*
 Кельтан 28, 37
 Корал 87, 123
 Которан 141
 Кумафос. См. *корал*
 Линдан. См. *гамма-ГХЦГ*
 Линурон 137, 139, 142
 Лорокс. См. *линурон*
 Малоран 139, 141
 Медь 232, 233
 Медный купорос 232, 233
 Мезоранил 215
 Меназон. См. *сайфос*
 Метазин 215
 Метафос 57, 66, 72, 83, 123
 Метилмеркурхлорид 235, 239
 Метилнитрофос 57, 72, 89, 123
 Метилртуть 239
 Метоксикарагард 216
 Метоксихлор 35
 Метоксуран. См. *дозанекс*
 Метопротрин 215
 Милогард. См. *пропазин*
 Мильбекс 105
 Монурон 139
 Мускатокс. См. *корал*
 2М-4ХМ (2-метил-4-хлорфеноксисукусная кислота) 196, 198
 2М-4ХМ (2-метил-4-хлорфеноксимасляная кислота) 196
 2М-4ХП (2-метил-4-хлорфеноксипропеновая кислота) 196
 Н-2810. См. *линурон*
 Нитран. См. *трефлан*
 Нитрофен. См. *нитрохлор*
 Нитрохлор 29
 Нуван. См. *ДДВФ*
 Оксамат 209
 Паторан 142
 Пенокумарин 227
 Пентахлорнитробензол 31
 Пиримикарб. См. *пиримор*
 Пиримор 150
 Полихлорированные бифенилы (ПХБ) 6, 10, 17
 Полихлорированные нафталины (ПХН) 10
 Полихлорированные терфенилы (ПХТ) 10
 ПП-175. См. *сайфос*
 Пребан. См. *игран*
 Префар 90
 Префикс 203
 Приматол-А. См. *атразин*
 Приматол-М. См. *гардоприм*
 Приматол-П. См. *пропазин*
 Приматол-С. См. *симазин*
 Прометрин 215
 Пропазин 215
 Пропанид 79, 161
 Пропоксур 154
 ПХНБ. См. *пентахлорнитробензол*
 ПЭБК. См. *тиллам*
 Р-7465. См. *дервинол*
 Резитокс. См. *корал*
 Рицид 79, 124
 Рогор. См. *фосфамид*
 Ртуть общая 241, 248
 Ртутьорганические пестициды, 232, 233, 235, 238, 239
 С-1983. См. *теноран*
 Сайфос 57, 72, 93, 95
 Сатурн 156
 Сафизон. См. *сайфос*
 Сафикол. См. *сайфос*
 Севин 162
 Семерон 215
 Сероуглерод 260
 Симазин 215
 Совол 11, 13, 16
 Совтол 11
 Соединение 29659. См. *теноран*
 Солан 139
 Суффикс 201
 2,4,5-Т 177, 182, 187, 190, 193
 Тедион 35
 Теноран 139, 144
 Тербутрин. См. *игран*
 Тиллам 164
 Тиофанат. См. *топсин НФ-35*
 Тиофанат-метил. См. *топсин НФ-44*
 Топсин НФ-35 145
 Топсин НФ-44 145
 Трефлан 49
 Трифлорамин. См. *трефлан*
 Трихлорацетат натрия 212
 Трихлорметафос-3. См. *ТХМ-3*
 Трихлоруксусная кислота 212
 Трихлорфон. См. *хлорофос*
 Трихотецин 258

Тролен 72
ТХД 12, 13, 16
ТХМ-3, 18, 72
Фамофос. См. *варбекс*
Фамур. См. *варбекс*
Фенеткарб 154
Фенитрооксон 124
Фенкаптон 57, 81, 123
Фенохлор 10
Фозалон 57, 72, 81, 101, 105, 107,
109, 114, 123
Фоксим 57, 97, 99, 123
Фосфамид 57, 63, 64, 81, 117, 118,
124, 128
Фталофос 57, 72, 81, 112, 114, 123

Хлоркарагард. См. *гардоприм*
Хлороксурон. См. *теноран*
Хлорорганические пестициды 6, 10,
18, 34
Хлорфен 10, 13, 16
Хлорфенокарб. См. *теноран*

Хлорофос 72, 75, 124, 128, 129
Хлорэтанол. См. *кельтан*
Церкобин. См. *толсины НФ-35 и*
НФ-44
Цианамид-38023. См. *варбекс*
Цианокс 57, 120, 124
Цианоксон 122
Цидиал 57, 81
Циодрин 124
Цитразин. См. *симазин*

Четыреххлористый углерод 46, 232

Экзотоксин 253
Энид. См. *дифенамид*
Эптам 164
ЭПТК. См. *эптам*
Этилмеркурхлорид 235, 239
ЭФ-2 33
Эфирсульфонат 35

Ялан 79, 161

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------|---|
| Предисловие | 3 |
|-----------------------|---|

ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕСТИЦИДЫ

| | |
|--|----|
| Методические указания по определению остаточных количеств хлорсодержащих пестицидов (гексахлорбензола, α - и γ -изомеров ГХЦГ, ДДЭ, ДДТ) в почве методом газо-жидкостной хроматографии | 5 |
| Методические указания по определению хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов при их совместном присутствии в объектах внешней среды и биоматериале | 10 |
| Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в сырье для производства детских сухих молочных смесей | 1 |
| Методические указания по определению гексахлорбутадиена в почве газохроматографическим методом | 21 |
| Методические указания по определению остаточных количеств деспироля (келевана) в картофеле, свекле, почве | 22 |
| Методические указания по газохроматографическому определению дилора в почве, кормах, органах и тканях животных | 24 |
| Методические указания по определению кельтана в молоке газохроматографическим методом | 28 |
| Методические указания по определению нитрохлора в капусте и воде методом газо-жидкостной хроматографии | 29 |
| Методические указания по определению пентахлорнитробензола в зерне и воде газо-жидкостной хроматографией | 31 |
| Методические указания по определению ЭФ-2 в зерне методом газо-жидкостной хроматографии | 33 |
| Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое | 34 |
| Методические указания по определению четыреххлористого углерода в зерне фотоколориметрическим методом | 46 |

ФТОРОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕСТИЦИДЫ

| | |
|--|----|
| Методические указания по определению микроколичеств трефлана и нитрофора | 49 |
|--|----|

ФОСФОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕСТИЦИДЫ

| | |
|--|----|
| Методические указания по определению фосфорорганических пестицидов (амифос, антио, афуган, базудин, бромфос, валексон, гардона, карбофос, метафос, метилнитрофос, сайфос, цианокс, цидиал, фенкаптон, фозалон, фосфамид, фталофос) в воде хроматографическими методами | 57 |
| Методические указания по определению антио и фосфамида в меде методом хроматографии в тонком слое | 63 |
| Методические указания по определению антио и фосфамида в кормах методом тонкослойной хроматографии | 64 |
| Методические указания по определению бромфоса в почве, воде, фруктах хроматографическими методами | 66 |

| | |
|--|-----|
| Методические указания по определению варбекса в молоке и тканях животных методом газо-жидкостной хроматографии | 69 |
| Методические указания по определению гетерофоса в почве и овощах газо-жидкостной хроматографией | 70 |
| Методические указания по определению диазинона в почве газо-жидкостной хроматографией | 72 |
| Методические указания по определению ДДВФ в молоке и воде методом газо-жидкостной хроматографии | 73 |
| Методические указания по определению ДДВФ в тканях животных методом хроматографии в тонком слое | 75 |
| Методические указания по определению абата (дифоса) в мясе и молоке методом хроматографии в тонком слое | 77 |
| Методические указания по определению изофоса-3 в почве хроматографическими методами | 78 |
| Методические указания по определению карбофоса в почве методом хроматографии в тонком слое | 81 |
| Методические указания по определению карбофоса в зерне и метафоса в капусте методом газо-жидкостной хроматографии | 83 |
| Методические указания по определению карбофоса в тканях животных методом хроматографии в тонком слое | 85 |
| Методические указания по определению корала в воде и биологическом материале | 87 |
| Методические указания по определению метилнитрофоса в мясе, яйцах, молоке методом газо-жидкостной хроматографии | 89 |
| Методические указания по определению префара в томатах, арбузах, овощах и воде хроматографическими методами | 90 |
| Методические указания по определению сайфоса в растительном материале и почве методом тонкослойной хроматографии | 93 |
| Методические указания по определению сайфоса в растительном материале методом спектрофотометрии | 95 |
| Методические указания по энзимно-хроматографическому определению фоксима в зерне и продуктах его переработки | 97 |
| Методические указания по определению фоксима (валексона) в молоке и тканях животных методом газо-жидкостной хроматографии | 99 |
| Методические указания по определению остаточных количеств фозалона в почве хроматографическими методами | 100 |
| Методические указания по определению фозалона и мильбекса в биологическом материале газо-жидкостной хроматографией | 105 |
| Методические указания по определению фозалона в молоке, тканях животных и кормах методом тонкослойной хроматографии | 107 |
| Методические указания по определению фозалона в растительном материале, кормах, биологическом материале методом газо-жидкостной хроматографии | 109 |
| Методические указания по определению фталофоса, его метаболитов и промежуточных продуктов синтеза в биологических субстратах методом хроматографии в тонком слое | 112 |
| Методические указания по определению фталофоса и фозалона в воде и рыбе и фозалона в кормах и мясе методом тонкослойной хроматографии | 114 |
| Методические указания по определению антио и фосфамида во фруктах методом газо-жидкостной хроматографии | 117 |
| Методические указания по определению фосфамида в почве хроматографическими методами | 118 |
| Методические указания по определению цианокса в яблоках хромато-энзимным методом | 120 |
| Методические указания по определению фосфорорганических пестицидов в растительных продуктах и биологических субстратах энзимно-хроматографическим методом | 122 |
| Методические указания по определению хлорофоса и фосфамида в плодах шиповника методом тонкослойной хроматографии | 128 |
| Методические указания по определению хлорофоса в молоке, тканях животных и яйцах кур газо-адсорбционным методом | 129 |

ПРОИЗВОДНЫЕ МОЧЕВИНЫ

| | |
|--|-----|
| Методические указания по определению гаттона в воде и продуктах растительного происхождения фотометрическим методом | 131 |
| Методические указания по определению дикурана в сырье мака масляного методом хроматографии в тонком слое | 133 |
| Методические указания по определению дозанекса в воде, овощах, зерне методом тонкослойной хроматографии | 135 |
| Методические указания по определению линурона в эфирных маслах в маслосодержащем сырье методом газо-жидкостной хроматографии | 137 |
| Методические указания по определению малорана в воде хроматографическими методами | 139 |
| Методические указания по определению малорана и которана в овощных и лекарственных культурах методом хроматографии в тонком слое | 141 |
| Методические указания по определению тенорана в ягодах земляники и почве методом хроматографии в тонком слое | 144 |
| Методические указания по определению топсинов НФ-35 и НФ-44 в воде, овощах и фруктах методом хроматографии в тонком слое | 145 |

ПРОИЗВОДНЫЕ КАРБАМИНОВОЙ, ТИО- И ДИТИОКАРБАМИНОВОЙ КИСЛОТ

| | |
|--|-----|
| Методические указания по определению бетанала в биологических средах методом хроматографии в тонком слое | 148 |
| Методические указания по определению пиримора в продуктах растительного происхождения, воде и почве хроматографическими методами | 150 |
| Методические указания по определению пропоксура и фенеткарба в молоке и мясе методом тонкослойной хроматографии | 154 |
| Методические указания по определению сатурна в воде, почве и рисе хроматографическими методами | 156 |
| Методические указания по определению севина в биологических субстратах и воде методом тонкослойной хроматографии | 162 |
| Методические указания по определению эптама и тиллама в воде, почве, свекле и ботве методом газо-жидкостной хроматографии | 164 |

КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ

| | |
|--|-----|
| Методические указания по определению амибена в воде методом газо-жидкостной хроматографии | 167 |
| Методические указания по определению дактала в воде, почве, картофеле методом газо-жидкостной хроматографии | 169 |
| Методические указания по определению натриевой соли α, α -дихлорпропионовой кислоты (далапон) в воде и почве хроматографическими методами | 170 |
| Методические указания по определению дифенамида в томатах методом тонкослойной хроматографии | 174 |
| Методические указания по определению 2,4-дихлорфеноксисукусной кислоты (2,4-Д) в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения хроматографическими методами | 176 |
| Методические указания по определению 2,4-дихлорфеноксисукусной кислоты (2,4-Д) в воде и пищевых продуктах хроматографическими методами | 182 |
| Методические указания по определению полиэтиленгликолевого эфира 2,4-дихлорфеноксисукусной кислоты (2,4-Д) в воде и зерне методом газо-жидкостной хроматографии | 187 |
| Методические указания по определению бензилового эфира 2,4-дихлорфеноксисукусной кислоты (2,4-Д) в воде и зерне методом газо-жидкостной хроматографии | 190 |
| Методические указания по определению γ -(2,4-дихлорфенокси)-масляной кислоты (2,4-ДМ) в воде, растительном материале и продуктах питания хроматографическими методами | 193 |
| Методические указания по определению 2-метил-4-хлорфеноксисукусной (2М-4Х), 2-метил-4-хлорфеноксипропионовой (2М-4ХП) и 2-метил-4-хлорфеноксимасляной (2М-4ХМ) кислот в воде методом газо-жидкостной хроматографии | 196 |

| | |
|---|-----|
| Методические указания по определению 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной кислоты (2М-4Х) в воде, растительном материале и продуктах питания методом газо-жидкостной хроматографии | 198 |
| Методические указания по определению суффикса (карахола) в воде и зерне методом газо-жидкостной хроматографии | 201 |
| Методические указания по определению префикса и касарона в воде, почве и растительном материале хроматографическими методами | 203 |
| Методические указания по определению оксамата в молоке и тканях животных методом газо-жидкостной хроматографии | 209 |
| Методические указания по определению препарата девринола в воде и растительном материале методом хроматографии в тонком слое | 210 |
| Методические указания по определению трихлоруксусной кислоты и трихлорацетата натрия в воде, почве и растительном материале методом газо-жидкостной хроматографии | 212 |

СИММ-ТРИАЗИНЫ

| | |
|---|-----|
| Методические указания по определению симм-триазинов (симазина, атразина, прометрина, пропазина, играна, карагарда, метопротрина, метазина, семерона, мезоранила) в зерне, фруктах, овощах, почве, воде хроматографическими методами | 215 |
| Методические указания по определению гардоприма в воде, почве и растительном материале | 223 |

ПРОИЗВОДНЫЕ КУМАРИНА

| | |
|--|-----|
| Методические указания по определению зоокумарина в тканях и крови животных, в приманках и препарате (пенокумарин) хроматографическими и спектрофотометрическими методами | 227 |
|--|-----|

МЕДЬ- И РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ

| | |
|--|-----|
| Методические указания по определению меди в абрикосах и винограде колориметрическим методом | 232 |
| Методические указания по определению меди в компотах, соках, варенье, маринадах колориметрическим методом | 233 |
| Методические указания по определению метил- и этилртути в пищевых продуктах, кормах и почве методом газовой хроматографии | 235 |
| Методические указания по определению ртутиорганических пестицидов в овощах, продуктах животноводства, кормах и патматериале хроматографическими методами | 238 |
| Методические указания по определению содержания общей ртути в мясе, мясопродуктах, яйцах, рыбе, молочных продуктах, шоколаде, почве колориметрическим способом или при помощи тонкослойной хроматографии | 241 |
| Методические указания по определению ртути в рыбе и молочных продуктах хроматографическим методом | 248 |

БИОПРЕПАРАТЫ

| | |
|--|-----|
| Методические указания по определению гомелина в объектах окружающей среды микробиологическим методом | 251 |
| Методические указания по определению β-эксзотоксина в продуктах урожая сельскохозяйственных растений | 253 |
| Методические указания по определению витамина А в тканях и внутренних органах животных и птиц методом тонкослойной хроматографии | 255 |
| Методические указания по определению витамина А в мясе и биологическом материале методом тонкослойной хроматографии | 256 |
| Методические указания по определению трихотецина в продуктах урожая сельскохозяйственных растений хроматополярографическим методом | 258 |

РАЗНОЕ

| | |
|---|-----|
| Методические указания по определению сероуглерода в винограде колориметрическим методом | 260 |
| Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, | |

| | |
|---|-----|
| продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов | 261 |
| <i>Приложение 1.</i> Отбор проб растительного материала на корню | 274 |
| <i>Приложение 2.</i> Отбор проб мяса и внутренних органов убойных животных и проб рыбы | 281 |
| <i>Приложение 3.</i> Отбор проб материалов со складов, баз, хранилищ, транспортных средств | 283 |
| <i>Приложение 4.</i> Отбор проб лекарственных и ароматических растений | 289 |
| <i>Приложение 5.</i> Выписка из перечня «Допустимые остаточные количества пестицидов в пищевых продуктах» и дополнения к нему, утвержденные Минздравом СССР | 291 |
| Список сокращенных названий научных учреждений, встречающихся в справочнике | 296 |
| Предметный указатель | 297 |

**Кира Федоровна Новикова,
Валентина Николаевна Полякова,
Галина Алексеевна Хохолькова и др.**

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОКОЛИЧЕСТВ
ПЕСТИЦИДОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, КОРМАХ
И ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ**

СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Заведующая редакцией *М. М. Антонова*
Редактор *Л. И. Гоменюк*
Художник *В. Н. Иванов*
Художественный редактор *М. Д. Северина*
Технический редактор *Е. В. Соломович*
Корректор *Д. Е. Ткачева*

ИБ № 3191

Сдано в набор 06.08.82. Подписано к печати 04.04.83. Т-00400. Формат 60×90^{1/16}. Бумага кн. ж. № 2 Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 19 Усл. кр.-отт. 19. Уч.-изд. л. 28,77. Изд. № 209. Тираж 11 000 экз. Заказ № 1360. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Колос»,
107807, ГСП, Москва, Б-53, ул. Садовая-Спасская, 18.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.