
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
57482—
2017

КОРМ ПАСТБИЩНЫЙ

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса» Российской академии наук (ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 130 «Кормопроизводство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2017 г. № 481-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2020 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, оформление, 2017, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

КОРМ ПАСТБИЩНЫЙ**Технические условия**

Pasture fodder. Specifications

Дата введения — 2018—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на корм, поедаемый животными непосредственно с пастбищ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения).

ГОСТ 13496.4 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина

ГОСТ 13496.19 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов

ГОСТ 13496.20 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов

ГОСТ 23153 Кормопроизводство. Термины и определения

ГОСТ 26176 Корма, комбикорма. Методы определения растворимых и легкогидролизуемых углеводов

ГОСТ 26226 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания сырой золы

ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

ГОСТ 26929 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Методы определения мышьяка

ГОСТ 30692 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомно-абсорбционный метод определения содержания меди, свинца, цинка и кадмия

ГОСТ 31640 Корма. Методы определения содержания сухого вещества

ГОСТ 31650 Средства лекарственные для животных, корма, кормовые добавки. Определение массовой доли ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии

ГОСТ 31653 Корма. Метод иммуноферментного определения микотоксинов

ГОСТ 31675 Корма. Методы определения содержания сырой клетчатки с применением промежуточной фильтрации

ГОСТ 32040 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира и влаги с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области

ГОСТ 32044.1 (ISO 5983-1:2005) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Часть 1. Метод Кьельдала

ГОСТ 32193 Корма, комбикорма. Определение остатков фосфорорганических пестицидов методом газовой хроматографии

ГОСТ 32194 Корма, комбикорма. Определение остатков хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии

ГОСТ Р 53100 Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма, кормовые добавки. Определение массовой доли кадмия и свинца методом атомно-абсорбционной спектроскопии

ГОСТ Р 53101 Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма, кормовые добавки. Определение массовой доли мышьяка методом атомно-абсорбционной спектроскопии

ГОСТ Р 54040 Продукция растениеводства и корма. Метод определения Cs¹³⁷

ГОСТ Р 55452 Сено и сенаж. Технические условия

ГОСТ Р 56912 Корма зеленые. Технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 23153, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **урожайность**: Урожай травы с единицы площади пастбища.

3.2 **фактическая урожайность**: Часть урожая, потребленная животными при данных условиях выпаса.

3.3 **остаток пастбищного корма**: Часть урожая, не потребленная животными при данных условиях выпаса.

3.4 **суточное потребление**: Количество килограммов сухого вещества или питательных веществ, съеденное одним животным за сутки.

4 Технические требования

4.1 Пастбищный корм должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и производиться в соответствии с регламентом производства (технологической инструкцией, стандартом организации и др.), утвержденным для конкретного предприятия с соблюдением нормативных правовых актов Российской Федерации¹⁾.

4.2 В качестве пастбищного корма используется надземная масса сеяных многолетних бобовых и злаковых трав, а также естественные травостои улучшенных кормовых угодий.

4.3 По органолептическим показателям пастбищный корм должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика
Высота травостоя, см	15—30
Фаза вегетации: - бобовых - злаков - разнотравья	Стеблевание Кущение Стеблевание
Цвет травостоя	От светло-зеленого до темно-зеленого

¹⁾ До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации — нормативных документов федеральных органов исполнительной власти [1]—[4].

Окончание таблицы 1

Наименование показателя	Характеристика
Запах	Специфический, свойственный зеленой массе данной травосмеси
Наличие не разравненных экскрементов и посторонних примесей	Не допускается

4.4 По концентрации питательных веществ и потреблению сухого вещества пастбищный корм должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Норма и характеристика для классов		
	1-го	2-го	3-го
Концентрация в сухом веществе, г/кг:			
- сырого протеина, не менее	150	140	130
- сырой клетчатки, не более	240	260	280
- водорастворимых углеводов, не менее	120	100	80
- сырой золы, не более	90	110	130
Суточное потребление сухого вещества, кг/100 кг живой массы, не менее	2,6	2,3	2,0

5 Требования безопасности

5.1 Содержание вредных и ядовитых растений (см. приложение А) не должно превышать 1 %, триходесмы седой — 0,3 %.

5.2 Травостои, предназначенные для использования в качестве пастбищного корма, обработанные гербицидами и пестицидами, стравливают не ранее, чем предусмотрено инструкцией по применению данного пестицида или гербицида.

5.3 Содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов, нитратов и нитритов в пастбищном корме не должно превышать допустимые уровни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации¹⁾.

6 Правила приемки

6.1 Пастбищный корм принимают по загонам с учетом однородности типа травостоя по ботаническому составу, высоте трав, фазе вегетации преобладающего вида растений. Для проверки соответствия качества пастбищного корма требованиям настоящего стандарта с каждого участка отбирают пробу.

6.2 Качество пастбищного корма определяют не раньше, чем за двое суток перед стравливанием. На каждый загон пастбища составляют паспорт качества (см. приложение Б).

6.3 Потребитель не должен принимать пастбищный корм от поставщика без предъявления паспорта качества.

6.4 При возникновении между поставщиком и потребителем разногласий в оценке качества пастбищного корма проводят совместно с заинтересованными сторонами повторно отбор проб и химический анализ.

7 Методы испытаний

7.1 Отбор пробы

Для отбора проб пастбищного корма перед началом стравливания и его остатков после пастбы делают прокос шириной одного прохода косилки по всей длине загона. На прокосе выделяют

¹⁾ До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации — нормативными документами федеральных органов исполнительной власти [1]—[4].

6—8 контрольных площадок по 10 м², кормовую массу на которых собирают, взвешивают, и горстями на всю глубину каждого вороха отбирают по 10 точечных проб. Затем из точечных проб со всех площадок составляют объединенную пробу, перемешивают и расстилают тонким слоем на пластмассовой пленке и методом квартования отбирают две средние пробы массой не менее 0,5 и 1,0 кг. Пробу массой 1,0 кг помещают в полиэтиленовый пакет, вкладывают паспорт корма (см. приложение В), тщательно завязывают и сразу же отправляют в лабораторию для определения содержания сухого вещества и других подлежащих анализу веществ. В случае если в день отбора пробы не отправлены в лабораторию, их необходимо хранить в холодильнике не более суток.

Среднюю пробу массой 0,5 кг используют для анализа ботанического состава.

7.2 Определение суточного потребления сухого вещества

7.2.1 Определение урожайности и остатка нестравленного пастбищного корма

Взвешенную кормовую массу со всех контрольных площадок делят на их количество и умножают на 10. Результат выражают в килограммах на гектар.

7.2.2 Определение фактической урожайности

Из урожайности вычитают массу нестравленного остатка пастбищного корма.

7.2.3 Поедаемость корма на голову в сутки определяют делением фактической урожайности пастбищного корма на количество голово-дней в течение конкретного цикла стравливания.

7.2.4 Суточное потребление сухого вещества пастбищного корма, в пересчете на 100 кг живой массы животного (СПСВ), рассчитывают по формуле

$$\text{СПСВ} = \frac{(Y - O) \cdot 100}{\text{Д} \cdot \text{Ч} \cdot \text{ЖМ}}$$

где Y — урожайность травы пастбища, кг СВ/га;

O — нестравленные остатки пастбищного корма, кг СВ/га;

Д — продолжительность выпаса животных, дней;

Ч — численность поголовья;

ЖМ — средняя живая масса одной головы скота, кг.

7.3 Фаза вегетации трав — по ГОСТ Р 56912.

7.4 Цвет пастбищного корма определяют визуально при естественном дневном освещении.

7.5 Определение сухого вещества — по ГОСТ 31640.

7.6 Определение массовой доли сырого протеина — по ГОСТ 13496.4, ГОСТ 32040, ГОСТ 32044.1.

7.7 Определение массовой доли сырой клетчатки — по ГОСТ 31675, ГОСТ 32040.

7.8 Определение водорастворимых углеводов — по ГОСТ 26176.

7.9 Определение массовой доли сырой золы — по ГОСТ 26226.

7.10 Определение содержания нитратов и нитритов — по ГОСТ 13496.19.

7.11 Определение остаточных количеств пестицидов — по ГОСТ 13496.20.

7.12 Определение токсичных элементов:

- меди, цинка, свинца и кадмия — по ГОСТ 30692, ГОСТ Р 53100;

- ртути — по ГОСТ 26927, ГОСТ 31650, [5];

- мышьяка — по ГОСТ 26930, ГОСТ Р 53101.

7.13 Определение микотоксинов — по ГОСТ 31653.

7.14 Подготовка проб и минерализация для определения токсичных элементов — по ГОСТ 26929.

7.15 Определение радионуклидов — по ГОСТ Р 54040.

7.16 Определение ботанического состава — по ГОСТ Р 55452.

7.17 Определение остатков фосфорорганических пестицидов — по ГОСТ 32193.

7.18 Определение остатков хлорорганических пестицидов — по ГОСТ 32194.

7.19 Определение ртутьорганических пестицидов — по [6].

**Приложение А
(обязательное)**

**Наиболее распространенные ядовитые и вредные растения,
встречающиеся в пастбищном корме**

Русское название растения	Латинское название растения
Ядовитые травы	
Авран аптечный	<i>Gratiola officinalis</i> L.
Безвременник осенний	<i>Colchicum autumnale</i> L.
Белена черная	<i>Hyoscyamus niger</i> L.
Белокрыльник болотный	<i>Calla palustris</i> L.
Болиголов пятнистый	<i>Conium maculatum</i> L.
Борец	<i>Aconitum</i> L.
Вех ядовитый	<i>Cicuta virosa</i> L.
Вороний глаз	<i>Paris quadrifolia</i> L.
Гармала обыкновенная	<i>Peganum harmala</i> L.
Гелиотроп опушенный	<i>Heliotropium</i> L.
Горчак ползучий	<i>Acroptilon repens</i> L.
Гулявник ядовитый	<i>Sisymbrium tochofillum</i> C.A.Mey
Дубровник обыкновенный	<i>Teucrium scordium</i> L.
Дурман обыкновенный	<i>Datura stramonium</i> L.
Живокость	<i>Delphinium</i>
Звездчатка злаковая	<i>Stellaria graminea</i> L.
Калужница болотная	<i>Caltha palustris</i> L.
Кокорыш — собачья петрушка	<i>Aethusa cynapium</i> L.
Крестовник Якоба	<i>Senecio Jacobaea</i> L.
Мак-самосейка	<i>Papaver rhoeas</i> L.
Молочай острый	<i>Euphorbia esula</i> L.
Мордовник степной	<i>Echinops ritro</i> L.
Наперстянки	<i>Digitalis</i> L.
Орляк обыкновенный	<i>Pteridium aquilinum</i> L.
Полынь таврическая	<i>Artemisia taurica</i> Wild.
Плевел опьяняющий	<i>Lolium temulentum</i> L.
Повилика европейская	<i>Cuscuta europaea</i> L.
Пролески	<i>Scilla</i> L.
Резуховидка стрелолистная	<i>Arabidopsis toxophilla</i> M.B.
Термопсис ланцетный	<i>Thermopsis lanceolata</i> R.Br.
Триходесма седая	<i>Trichodesma incanum</i> DC
Хвощ топяной	<i>Equisetum heleocharis</i> Ehrh.
Чемерица белая и черная	<i>Equisetum heleocharis</i> Ehrh.
Чемерица Лобеля	<i>Veratrum lobelianum</i> Bernh.
Чистец однолетний	<i>Stachus annua</i> L.
Чистец прямой	<i>Stachus recta</i> L.
Вредные травы	
Бутень	<i>Cherophyllum temulum</i> L.
Ветреница дубравная	<i>Anemone nemorosa</i> L.
Ветреница лютиковая	<i>Anemone ranunculoides</i>
Лютики	<i>Ranunculus</i> L.
Паслен черный	<i>Solanum nigrum</i>
Паслен сладкогорький	<i>Solanum dulcamara</i>
Хвощ болотный	<i>Equisetum palustre</i> L.
Хвощ полевой	<i>Equisetum arvense</i> L.
Чистотел большой	<i>Chelidonium majus</i> L.

Приложение Б
(рекомендуемое)

Паспорт качества

Хозяйство, район, область _____

Отделение, № загона _____

Наименование травостоя _____

Ботанический состав (% или весовое соотношение) _____

Фаза вегетации _____

Цикл сраживания _____ Год пользования травостоем _____

Дата отбора пробы на анализ «_____» _____ 20____ г.

Ответственные за отбор проб:

Результаты исследований

Содержание сухого вещества, г/кг _____

Концентрация в сухом веществе: сырого протеина, г/кг _____

сырой клетчатки, г/кг _____ сырой золы, г/кг _____

нитратов, мг/кг _____

массовая доля ядовитых растений, % _____

Место для печати

«_____» _____ 20____ г.

Зав. лабораторией _____

Исполнитель _____

Приложение В
(рекомендуемое)

Бланк для учета сбора сухого вещества по циклам стравливания

Загон		Сбор сухого вещества до и после стравливания, кг/га							
№	площадь, га	I		II		III		IV	
		до	после	до	после	до	после	до	после
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

Библиография

- [1] № 123-4/281-87 Временный максимально допустимый уровень (МДУ) содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах для сельскохозяйственных животных и кормовых добавках
- [2] № 434-7 Максимально допустимый уровень микотоксинов в кормах
- [3] № 117-116 Предельно допустимые остаточные количества пестицидов в кормах для сельскохозяйственных животных
- [4] № 143-4/78-5а Нормы предельно допустимой концентрации нитратов и нитритов в кормах для сельскохозяйственных животных и основных видах сырья для комбикормов
- [5] МУ 5178-90 Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции
- [6] МУ 1218-75 Методические указания по определению ртутьорганических пестицидов в овощах, продуктах животноводства, кормах и патматериале хроматографическими методами

УДК 636.087.07:006.354

ОКС 65.120

Ключевые слова: корм пастбищный, фаза вегетации, сухое вещество, сырой протеин, сырая клетчатка, сырая зола, нитраты

Редактор переиздания *Д.А. Кожемяк*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *Г.В. Струковой*

Сдано в набор 02.03.2020. Подписано в печать 28.04.2020. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,27.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru