

Изменение № 2 ГОСТ 5964—82 Спирт этиловый. Правила приемки и методы испытаний

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.10.86 № 3176 срок введения установлен

с 01.03.87

Пункт 2.3.3.2. Заменить значение: 30 % на 40 %.

Пункт 2.6.3. Второй абзац после слов «визуально сравнивают» дополнить словами: «в проходящем свете»; после слова «стекла» дополнить словами: «подложив под цилиндр лист белой бумаги».

Пункт 3.3.4.1 дополнить абзацем (перед последним): «Массовую концентрацию сложных эфиров (X_2) в миллиграммах в пересчете на 1 дм³ безводного спирта вычисляют по формулам

для ректификованного спирта

$$X_2 = D_{\text{расч.}} \frac{100}{0,010219 \cdot C} ,$$

(Продолжение см. с. 242)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5964—82)

для этилового
спирта-сырца

$$X_2 = D_{\text{расч.}} \frac{100}{0,00099 \cdot C} ,$$

где $D_{\text{расч.}}$ — оптическая плотность, полученная в результате испытания;
0,010219 и 0,00099 — постоянные расчетные коэффициенты, полученные экспериментально;

C — концентрация спирта в исследуемом образце, % ».

(ИУС № 1 1987 г.)