



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 38247

от "29 июля 2015"

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минсельхоз России)

П Р И К А З

от 3 июня 2015 г.

№ 223

Москва

Об утверждении Методики определения объема и видового состава объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка


В соответствии с подпунктом «л» пункта 82 Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 21, ст. 2703), **п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить прилагаемую Методику определения объема и видового состава объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка.

Министр

А.Н. Ткачев

Копия верна:
старший специалист 1 разряда
отдела контроля, проверки исполнения
и архива Депуправделами



О.В.Гаранина

МЕТОДИКА

определения объема и видового состава объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка

1. Методика определения объема и видового состава объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка (далее - Методика) используется Федеральным агентством по рыболовству или его территориальными органами при организации и проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора пользования рыбоводным участком для осуществления пастбищной или индустриальной аквакультуры.

2. Для определения видового состава объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка (далее - видовой состав объектов аквакультуры), используются следующие показатели:

а) среднесуточная соленость поверхностных вод в границах рыбоводного участка (в промилле (‰));

б) минимальная температура поверхностных вод за последние 30 лет или за имеющийся период наблюдений, если он составляет менее 30 лет (в градусах Цельсия (°C));

в) максимальная температура поверхностных вод за последние 30 лет или за имеющийся период наблюдений, если он составляет менее 30 лет (в градусах Цельсия (°C));

г) минимальный расход воды в водотоке за последние 30 лет или за имеющийся период наблюдений, если он составляет менее 30 лет, при выделении рыбоводных участков для осуществления пастбищной аквакультуры тихоокеанских лососей в водотоках (в литрах в секунду (л/с) или в кубических метрах в секунду ($\text{м}^3/\text{с}$));

3. Показатели для определения видового состава объектов аквакультуры, предусмотренные пунктом 2 Методики, могут быть получены:

а) в ходе государственного мониторинга водных биологических ресурсов;

б) от Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (по запросу).

4. Видовой состав объектов аквакультуры определяется на основании:

а) расширенного видового состава объектов аквакультуры (определяется по солености воды на рыбоводном участке (таблицы «а» и «б» приложения № 1 к Методике);

б) ограниченного видового состава объектов аквакультуры по минимальной лимитирующей температуре воды в поверхностном слое на рыбоводном участке (из расширенного видового состава объектов аквакультуры исключают все объекты аквакультуры, для которых минимальная лимитирующая температура воды в поверхностном слое на рыбоводном участке (таблица «а» приложения № 1 к Методике) выше минимальной температуры воды в поверхностном слое на рыбоводном участке);

в) ограниченного видового состава объектов аквакультуры по максимальной лимитирующей температуре воды в поверхностном слое на рыбоводном участке (из расширенного видового состава объектов аквакультуры исключают все объекты аквакультуры, для которых максимальная лимитирующая температура воды в поверхностном слое на рыбоводном участке (таблица «б» приложения № 1 к Методике) ниже максимальной температуры воды в поверхностном слое на рыбоводном участке).

Видовой состав объектов аквакультуры определяется посредством исключения из расширенного видового состава объектов аквакультуры ограниченного видового состава объектов аквакультуры по минимальной лимитирующей температуре воды в поверхностном слое на рыбоводном участке и ограниченного видового состава объектов аквакультуры по максимальной лимитирующей температуре воды в поверхностном слое на рыбоводном участке.

5. Расчет минимального ежегодного объема подлежащих изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении пастбищной аквакультуры (далее - объем подлежащих изъятию объектов пастбищной аквакультуры), за исключением тихоокеанских лососей, производится по формуле:

$$N_{\text{паст}} = \frac{P_{\text{паст}} \times S_{\text{паст}}}{i \times 1000} \quad (1),$$

где:

$N_{\text{паст}}$ - минимальный ежегодный объем подлежащих изъятию объектов пастбищной аквакультуры, т/год;

$P_{\text{паст}}$ - удельный объем подлежащих изъятию объектов пастбищной аквакультуры, кг/га × год;

$S_{\text{паст}}$ - площадь акватории в границах рыбоводного участка, пригодная для выращивания объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры, га;

i - продолжительность периода выращивания, лет;

1000 - множитель для перевода килограммов в тонны.

Значения удельного объема подлежащих изъятию объектов пастбищной аквакультуры ($P_{\text{паст}}$) и продолжительности периода выращивания (i) для субъектов Российской Федерации и разных типов водных объектов приведены в приложении № 2 к Методике.

Площадь акватории в границах рыбоводного участка, пригодная для выращивания объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной

аквакультуры ($S_{\text{паст}}$), для обитающих в водной толще объектов аквакультуры составляет вся площадь рыбоводного участка; для объектов аквакультуры, относящихся к «сидячим видам» - площадь той части рыбоводного участка, на которой имеется грунт, пригодный для обитания этих объектов аквакультуры.

6. Расчет минимального ежегодного объема подлежащих изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка тихоокеанских лососей, выращиваемых при осуществлении пастбищной аквакультуры, производится в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 534 «Об утверждении методики расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры» (зарегистрирован в Минюсте России 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36097).

7. Расчет минимального ежегодного объема подлежащих изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении индустриальной аквакультуры (далее - объем подлежащих изъятию объектов индустриальной аквакультуры), производится по формуле:

$$N_{\text{индустр}} = \frac{R_{\text{индустр}} \times S_{\text{индустр}} \times 0,35}{i} \quad (2),$$

где:

$N_{\text{индустр}}$ - минимальный ежегодный объем подлежащих изъятию объектов индустриальной аквакультуры, т/год;

$R_{\text{индустр}}$ - удельный объем подлежащих изъятию объектов индустриальной аквакультуры, т/га × год;

$S_{\text{индустр}}$ - площадь акватории в границах рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других технических средств, предназначенных для выращивания объектов аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, га;

0,35 – коэффициент сглаживания неоднородности акватории;

i – продолжительность периода выращивания, лет.

Значения удельного объема изъятия объектов индустриальной аквакультуры ($R_{\text{индустр}}$) и продолжительности периода выращивания (i) для разных субъектов Российской Федерации приведены в приложении № 3 к Методике.

8. Площадь акватории в границах рыбоводного участка, пригодная для установки садков и (или) других технических средств, предназначенных для выращивания объектов аквакультуры в искусственно созданной среде обитания ($S_{\text{индустр}}$), определяется по географической карте и (или) схеме рыбоводного участка с нанесенными изобатами, исходя из следующих параметров:

а) в озерах, водохранилищах и на реках площадь акватории, пригодной для установки садков и (или) других технических средств, предназначенных для выращивания объектов аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, ограничивается акваторией от максимальных глубин до изобаты 5 м;

б) во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации площадь акватории, пригодной для установки садков и (или) других технических средств, предназначенных для выращивания объектов аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, кроме технических средств, указанных в подпункте «в» настоящего пункта, лежит между изобатами 15 м и 60 м;

в) во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации площадь акватории, пригодной для установки технических средств, предназначенных для выращивания макрофитов с горизонтальным креплением выростных субстратов в искусственно созданной среде обитания, лежит между изобатами 5 м и 60 м.

9. Расчет ежегодного объема подлежащих выпуску в водный объект в границах рыбоводного участка объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении пастбищной аквакультуры (далее - объем выпуска объектов пастбищной аквакультуры) производится в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 534 «Об утверждении методики расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры» (зарегистрирован в Минюсте России 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36097) методом обратного счета, исходя из минимального ежегодного объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении пастбищной аквакультуры, рассчитанного по пункту 5 Методики, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10 и 11 Методики.

10. Расчет минимального ежегодного объема подлежащих выпуску в водный объект в границах рыбоводного участка тихоокеанских лососей, выращиваемых при осуществлении пастбищной аквакультуры, производится с учетом сведений, указанных в подпункте «г» пункта 2 Методики, исходя из следующих соотношений на разных этапах цикла выращивания:

а) при выдерживании производителей расход воды не должен быть ниже 0,1 л/с на 1 кг массы производителей;

б) при набухании икры расход воды не должен быть ниже 0,5 л/с на 1 млн. икринок;

в) при инкубации икры расход воды не должен быть ниже 2 л/с на 1 млн. икринок;

г) при выдерживании личинок объектов аквакультуры расход воды не должен быть ниже 4 л/с на 1 млн. личинок объектов аквакультуры;

д) при выращивании молоди объектов аквакультуры в однолетнем цикле расход воды не должен быть ниже 10 л/с на 1 млн. шт. молоди объектов аквакультуры;

е) при выращивании молоди объектов аквакультуры в двухлетнем цикле расход воды не должен быть ниже 20 л/с на 1 млн. шт. молоди объектов аквакультуры.

11. Минимальный ежегодный объем выпуска объектов пастбищной аквакультуры в течение одного года после заключения договора пользования рыбоводным участком принимается равным нулю.

12. Расчет минимального ежегодного объема подлежащих выпуску объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении индустриальной аквакультуры, в садки и (или) другие технические средства, предназначенные для их выращивания в искусственно созданной среде обитания (далее - объем подлежащих выпуску в садки объектов индустриальной аквакультуры), кроме случаев, предусмотренных пунктами 13 и 14 Методики, производится по формулам:

$$N_{\text{вып. индустр. шт.}} = \frac{N_{\text{индустр.}} \times 1000 \times 100^i}{m \times S_1 \dots \times S_i} \quad (3),$$

$$N_{\text{вып. индустр. кг}} = \frac{N_{\text{индустр.}} \times 1000 \times 100^i}{S_1 \times \dots \times S_i} \quad (4),$$

где:

$N_{\text{вып. индустр. шт.}}$, $N_{\text{вып. индустр. кг}}$ - минимальный ежегодный объем подлежащих выпуску в садки объектов индустриальной аквакультуры, шт./год или кг/год;

$N_{\text{индустр.}}$ - минимальный ежегодный объем подлежащих изъятию объектов индустриальной аквакультуры, т/год;

m - минимальная масса объектов аквакультуры, кг;

S_1 - выживаемость в первый год выращивания, %;

S_i - выживаемость в i -тый год выращивания, %;

i – продолжительность периода выращивания, лет;

1000 - множитель для перевода тонн в килограммы;

100 - множитель для перевода процентов в десятые доли, возведенный в степень, соответствующую количеству лет выращивания.

Значения продолжительности периода выращивания (i) объектов индустриальной аквакультуры приведены в приложении № 3 к Методике.

Значения минимальной массы (m) и выживаемости (S) объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении индустриальной аквакультуры, приведены в приложении № 4 к Методике.

13. Минимальный ежегодный объем подлежащих выпуску в садки объектов индустриальной аквакультуры в течение одного года после заключения договора пользования рыбоводным участком принимается равным нулю.

14. Минимальный ежегодный объем подлежащих выпуску беспозвоночных и макрофитов, выращиваемых при осуществлении индустриальной аквакультуры, основанный на естественном оседании молоди объектов аквакультуры на технические средства, предназначенные для сбора и выращивания объектов аквакультуры в искусственно созданной среде обитания, не устанавливается.

15. Расчет ежегодного объема подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию объектов аквакультуры (далее - объем подлежащих выращиванию объектов аквакультуры) производится с использованием величин минимального ежегодного объема подлежащих изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка объектов аквакультуры, рассчитанного согласно пунктам 5, 6 и 7 Методики, и продолжительности периода выращивания, указанного в приложениях № 2 и № 3 к Методике, исходя из следующих соотношений:

а) с даты заключения договора пользования рыбоводным участком до половины первого периода выращивания минимальный ежегодный объем подлежащих выращиванию объектов аквакультуры принимается равным нулю;

б) со второй половины до конца первого периода выращивания минимальный ежегодный объем подлежащих выращиванию объектов аквакультуры принимается равным 50% от минимального ежегодного объема

подлежащих изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка объектов аквакультуры;

в) с начала второго периода выращивания до конца действия договора пользования рыбоводным участком минимальный ежегодный объем подлежащих выращиванию объектов аквакультуры принимается равным 75% от минимального ежегодного объема подлежащих изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка объектов аквакультуры.

Приложение № 1
к Методике определения объема
и видового состава объектов
аквакультуры, подлежащих разведению
и (или) содержанию, выращиванию,
а также выпуску в водный объект и
изъятию из водного объекта
в границах рыбоводного участка

Видовой состав объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка в зависимости от солености воды и температуры воды в поверхностном слое на рыбоводном участке

а) видовой состав объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка в зависимости от солености воды и от минимальной лимитирующей температуры воды в поверхностном слое на рыбоводном участке

Соленость воды	Минимальная лимитирующая температура воды в поверхностном слое на рыбоводном участке, °С					
	ниже 0,1	0,2–3,0	3,1–4,0	4,1–6,0	6,1–14,0	выше 14,1
Пресные воды (0-1,00 ‰)	-	Белорыбица и нельма (Stenodus leucichthys) Сиг (Coregonus ssp.) Муксун (Coregonus muksun) Тугун (Coregonus tugun) Омуль байкальский (Coregonus migratorius) Пелядь (Coregonus peled)	Хариус (Thymallus sp.) Сом обыкновенный (Silurus glanis) Сом Солдатова (Silurus soldatovi) Амур белый (Stenopharyngodon idella) Амур черный (Mylopharyngodon piceus) Буффало большеротый (Ictiobus	Черный амурский лещ (Megalobrama terminalis) Сомик американский (Ameiurus nebulosus) Угорь речной (Anguilla anguilla) Рак американский (Pacifastacus leniusculus) Сима (Oncorhynchus masu) Чавыча (Oncorhynchus	Линь (Tinca tinca)	Сом африканский лабиринтовый (Clarias gariepinus) Тиляпия мозамбикская (Oreochromis mossambicus) Тиляпия нильская

Соленость воды	Минимальная лимитирующая температура воды в поверхностном слое на рыбоводном участке, °С					
	ниже 0,1	0,2–3,0	3,1–4,0	4,1–6,0	6,1–14,0	выше 14,1
		Рипус (<i>Coregonus albus</i> form.) Гибриды сиговых Гибриды осетровых Породы радужной форели Желтощек (<i>Elopichthys bambusa</i>) Карась обыкновенный (<i>Carassius carassius</i>) Карась серебряный (<i>Carassius gibelio</i>) Лещ (<i>Abramis brama</i>) Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>) Минога речная (<i>Lampetra fluviatilis</i>)	супринеллус) Буффало малоротый (<i>Ictiobus bubalus</i>) Буффало черный (<i>Ictiobus niger</i>) Вырезуб и кутум (<i>Rutilus frisii</i>) Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>) Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>) Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>) Толстолобики гибридные Черный амурский лещ (<i>Megalobrama terminalis</i>) Шемая (<i>Chalcalburnus chalcoides</i>) Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i>) Окунь-ауха (<i>Siniperca chuatsi</i>) Щука обыкновенная (<i>Esox lucius</i>) Креветка пресноводная (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>) Рак речной узкопалый (<i>Astacus leptodactylus</i>) Рак речной	tshawytscha) Кижуч (<i>Oncorhynchus kisutch</i>) Нерка (<i>Oncorhynchus nerka</i>) Горбуша (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>) Кета (<i>Oncorhynchus keta</i>)		(<i>Oreochromis niloticus</i>)

Соленость воды	Минимальная лимитирующая температура воды в поверхностном слое на рыбоводном участке, °С					
	ниже 0,1	0,2–3,0	3,1–4,0	4,1–6,0	6,1–14,0	выше 14,1
			широкопалый (<i>Astacus astacus</i>)			
Солоноватые воды (1,01-15,00 ‰)	Вобла (<i>Rutilus caspicus</i>) Тарань (<i>Rutilus rutilus form. heckelii</i>)	Белуга (<i>Huso huso</i>) Калуга (<i>Huso dauricus</i>) Осетр русский (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>) Осетр сибирский (<i>Acipenser baerii</i>) Осетр амурский (<i>Acipenser schrenkii</i>) Севрюга (<i>Acipenser stellatus</i>) Кумжа (форель) (<i>Salmo trutta</i>) Гольцы (<i>Salvelinus sp.</i>) Паляя (<i>Salvelinus lepechini</i>) Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) Чир (<i>Coregonus nasus</i>) Омуль байкальский (<i>Coregonus migratorius</i>) Пелядь (<i>Coregonus peled</i>) Рипус (<i>Coregonus albula form.</i>) Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>)	Сом обыкновенный (<i>Silurus glanis</i>) Сом Солдатова (<i>Silurus soldatovi</i>) Креветка пресноводная (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>) Вырезуб и кутум (<i>Rutilus frisii</i>) Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i>) Окунь-ауха (<i>Sineperca chuatsi</i>)	Сомик американский (<i>Ameiurus nebulosus</i>)	Окунь полосатый (<i>Morone saxatilis</i>) Пиленгас (<i>Liza haematocheilis</i>)	Сом африканский лабиринтовый (<i>Clarias gariepinus</i>) Тиляпия мозамбикская (<i>Oreochromis mossambicus</i>) Тиляпия нильская (<i>Oreochromis niloticus</i>)

Соленость воды	Минимальная лимитирующая температура воды в поверхностном слое на рыбоводном участке, °С					
	ниже 0,1	0,2–3,0	3,1–4,0	4,1–6,0	6,1–14,0	выше 14,1
Морские воды с пониженной соленостью (15,01 – 33,9 ‰)	<p>Мидия Грея (<i>Stenomytilus grayanus</i>)</p> <p>Мидия тихоокеанская (<i>Mytilus trossulus</i>)</p> <p>Устрица гигантская (<i>Crassostrea gigas</i>)</p> <p>Мидия съедобная (<i>Mytilus edulis</i>)</p> <p>Краб камчатский (<i>Paralithodes camtschaticus</i>)</p> <p>Гребешок Свифта (<i>Chlamys swifti</i>)</p> <p>Гребешок приморский (<i>Mizuhopecten yessoensis</i>)</p> <p>Морской еж серый (<i>Strongylocentrotus intermedius</i>)</p> <p>Трепанг дальневосточный (<i>Apostichohus japonicus</i>)</p> <p>Ламинария беломорская (<i>Laminaria saccharina</i>)</p>	<p>Ряпушка (<i>Coregonus</i> sp.)</p> <p>Камбала калкан (<i>Psetta maotica</i>)</p> <p>Мидия средиземноморская (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)</p> <p>Лосось атлантический (семга) (<i>Salmo salar</i>)</p>	<p>Окунь полосатый (<i>Morone saxatilis</i>)</p> <p>Устрица плоская (<i>Ostrea edulis</i>)</p> <p>Скафарка неравностворчатая (<i>Scapharca inaequalis</i>)</p>	<p>Лосось черноморский (<i>Salmo trutta</i>)</p>	<p>Окунь полосатый (<i>Morone saxatilis</i>)</p> <p>Сингиль (<i>Liza aurata</i>)</p> <p>Лобан (<i>Mugil cephalus</i>)</p> <p>Пиленгас (<i>Liza haematocheilus</i>)</p>	

Соленость воды	Минимальная лимитирующая температура воды в поверхностном слое на рыбоводном участке, °С					
	ниже 0,1	0,2–3,0	3,1–4,0	4,1–6,0	6,1–14,0	выше 14,1
Нормальные морские воды (34-35 ‰)	Мидия тихоокеанская (<i>Mytilus trossulus</i>) Краб камчатский (<i>Paralithodes camtschaticus</i>) Гребешок Свифта (<i>Chlamys swifti</i>) Гребешок приморский (<i>Mizuhopecten yessoensis</i>) Морской еж серый (<i>Strongylocentrotus intermedius</i>) Ламинария беломорская (<i>Laminaria saccharina</i>) Трепанг дальневосточный (<i>Apostichohus japonicus</i>)	Лосось атлантический (семга) (<i>Salmo salar</i>)				

б) видовой состав объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка в зависимости от солености воды и от максимальной лимитирующей температуры воды в поверхностном слое на рыбоводном участке

Соленость воды	Максимальная лимитирующая температура воды в поверхностном слое на рыбоводном участке, °С					
	ниже 7,0	7,1-15,0	15,1-17,0	17,1-24,0	24,1-27,0	выше 27,1
Пресные воды (0-1,00 ‰)	Муксун (Coregonus muksun)	Ленок (Brachymystax lenok)	Гольцы (Salvelinus sp.) Палия (Salvelinus lepechini) Таймень (Huscho taimen) Ряпушка (Coregonus sp.) Омуль байкальский (Coregonus migratorius) Хариус (Thymallus sp.)	Пелядь (Coregonus peled) Желтощек (Elopichthys bambusa) Минога речная (Lampetra fluviatilis) Кета (Oncorhynchus keta) Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) Нерка (Oncorhynchus nerka) Кижуч (Oncorhynchus kisutch) Чавыча (Oncorhynchus tshawytscha) Сима (Oncorhynchus masu)	Осетр сибирский (Acipenser baerii) Осетр амурский (Acipenser schrenkii) Лосось атлантический (семга) (Salmo salar) Лосось каспийский (Salmo trutta) Лосось черноморский (Salmo trutta) Лосось озерный (Salmo salar) Кумжа (форель) (Salmo trutta) Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) породы радужной форели Белорыбица и нельма (Stenodus leucichthys) Тугун (Coregonus tugun) Рипус (Coregonus albula) Гибриды сиговых Амур белый (Stenopharyngodon idella)	Белуга (Huso huso) Калуга (Huso dauricus) Осетр русский (Acipenser gueldenstaedtii) Северюга (Acipenser stellatus) Стерлядь (Acipenser ruthenus) Породы осетровых Гибриды осетровых Веслонос (Polyodon spathula) Чир (Coregonus nasus) Пелядь (Coregonus peled) Амур черный (Mylopharyngodon piceus) Буффало большеротый (Ictiobus cyprinellus) Буффало малоротый (Ictiobus bubalus) Буффало черный (Ictiobus niger) Карась обыкновенный (Carassius carassius) Карась серебряный (Carassius gibelio) Лещ (Abramis brama) Линь (Tinca tinca) Сазан, карп (Cyprinus carpio) Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis)

Соленость воды	Максимальная лимитирующая температура воды в поверхностном слое на рыбоводном участке, °С					
	ниже 7,0	7,1-15,0	15,1-17,0	17,1-24,0	24,1-27,0	выше 27,1
						Толстолобики гибридные Шемая (<i>Chalcalburnus chalcoides</i>) Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i>) Сом обыкновенный (<i>Silurus glanis</i>) Сом Солдатова (<i>Silurus soldatovi</i>) Окунь-ауха (<i>Sineperca chuatsi</i>) Щука обыкновенная (<i>Esox lucius</i>) Угорь речной (<i>Anguilla anguilla</i>) Сомик американский (<i>Ameiurus nebulosus</i>) Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>) Сом африканский лабиринтовый (<i>Clarias gariepinus</i>) Пиленгас (<i>Liza haematocheilis</i>) Тиляпия мозамбикская (<i>Oreochromis mossambicus</i>) Тиляпия нильская (<i>Oreochromis niloticus</i>) Креветка пресноводная (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>) Рак американский (<i>Pacifastacus leniusculus</i>) Рак речной узкопалый (<i>Astacus leptodactylus</i>) Рак речной широкопалый (<i>Astacus astacus</i>)
Солоноватые воды (1,01-			Гольцы (<i>Salvelinus</i> sp.)	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	Лосось каспийский (<i>Salmo trutta</i>)	Белуга (<i>Huso huso</i>) Калуга (<i>Huso dauricus</i>)

Соленость воды	Максимальная лимитирующая температура воды в поверхностном слое на рыбоводном участке, °С					
	ниже 7,0	7,1-15,0	15,1-17,0	17,1-24,0	24,1-27,0	выше 27,1
15,00 ‰)			Палия (<i>Salvelinus lepechini</i>) Ряпушка (<i>Coregonus</i> sp.) Омуль байкальский (<i>Coregonus migratorius</i>)		Лосось черноморский (<i>Salmo trutta</i>) Вырезуб и кутум (<i>Rutilus frisii</i>)	Осетр русский (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>) Северюга (<i>Acipenser stellatus</i>) Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>) Породы осетровых Гибриды осетровых Веслонос (<i>Polyodon spathula</i>) Пелядь (<i>Coregonus peled</i>) Вобла (<i>Rutilus caspicus</i>) Тарань (<i>Rutilus rutilus</i> form.) Карась обыкновенный (<i>Carassius carassius</i>) Карась серебряный (<i>Carassius gibelio</i>) Лещ (<i>Abramis brama</i>) Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>) Сомик американский (<i>Ameiurus nebulosus</i>) Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>) Сом африканский лабиринтовый (<i>Clarias gariepinus</i>) Пиленгас (<i>Liza haematocheilis</i>) Окунь полосатый (<i>Morone saxatilis</i>) Тиляпия мозамбикская (<i>Oreochromis mossambicus</i>) Тиляпия нильская (<i>Oreochromis niloticus</i>) Креветка пресноводная (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>) Рак американский (<i>Pacifastacus leniusculus</i>)

Соленость воды	Максимальная лимитирующая температура воды в поверхностном слое на рыбоводном участке, °С					
	ниже 7,0	7,1-15,0	15,1-17,0	17,1-24,0	24,1-27,0	выше 27,1
Морские воды с пониженной соленостью (15,01 – 33,9 ‰)				Ламинария беломорская (<i>Laminaria saccharina</i>) Гребешок Свифта (<i>Chlamys swifti</i>)	Лосось каспийский (<i>Salmo trutta</i>) Лосось черноморский (<i>Salmo trutta</i>) Мидия средиземноморская (<i>Mytilus galloprovincialis</i>) Мидия тихоокеанская (<i>Mytilus trossulus</i>) Мидия Грея (<i>Crenomytilus grayanus</i>) Гребешок приморский (<i>Mizuhopecten yessoensis</i>) Морской еж серый (<i>Strongylocentrotus intermedius</i>) Сахарина японская (<i>Saccharina japonica</i>)	Сингиль (<i>Liza aurata</i>) Лобан (<i>Mugil cephalus</i>) Пиленгас (<i>Liza haematocheilis</i>) Окунь полосатый (<i>Morone saxatilis</i>) Камбала калкан (<i>Psetta maotica</i>) Устрица гигантская (<i>Crassostrea gigas</i>) Скафарка неравностворчатая (<i>Scapharca inaequalvis</i>)
Нормальные морские воды (34-35 ‰)		Краб камчатский (<i>Paralithodes camtschaticus</i>)	Гребешок приморский (<i>Mizuhopecten yessoensis</i>) Морской еж серый (<i>Strongylocentrotus intermedius</i>) Гребешок Свифта (<i>Chlamys swifti</i>) Ламинария беломорская (<i>Laminaria saccharina</i>) Сахарина японская (<i>Saccharina japonica</i>)	Мидия тихоокеанская (<i>Mytilus trossulus</i>) Мидия Грея (<i>Crenomytilus grayanus</i>) Гребешок приморский (<i>Mizuhopecten yessoensis</i>) Морской еж серый (<i>Strongylocentrotus intermedius</i>) Ламинария японская (<i>Laminaria japonica</i>)	Устрица гигантская (<i>Crassostrea gigas</i>) Трепанг дальневосточный (<i>Apostichohus japonicus</i>)	

Приложение № 2
к Методике определения объема и видового
состава объектов аквакультуры, подлежащих
разведению и (или) содержанию, выращиванию,
а также выпуску в водный объект
и изъятию из водного объекта в границах
рыбоводного участка

**Удельный объем подлежащих изъятию объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении пастбищной
аквакультуры, и продолжительность периода выращивания указанных объектов аквакультуры для разных
субъектов Российской Федерации и разных типов водных объектов**

а) озера и водохранилища

Субъекты Российской Федерации	Объекты аквакультуры	Продолжительность периода выращивания (i), лет	Удельный объем изъятия ($P_{\text{паст}}$), кг/га × год			
			6-10°C	11-15°C	16-25°C	выше 26°C
Республика Алтай	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	3		15		
	Чир (<i>Coregonus nasus</i>)	7		20		
	Песядь (<i>Coregonus peled</i>)	6		20		
Республика Башкортостан	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	7			3	
	Песядь (<i>Coregonus peled</i>)	6			30	
	Рипус (<i>Coregonus albula</i>)	3			7	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	5			0,8	
	Карась обыкновенный (<i>Carassius carassius</i>)	1			20	
	Лещ (<i>Abramis brama</i>)	4			30	
	Линь (<i>Tinca tinca</i>)	4			2	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4			20	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	5			2	
	Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i>)	6			0,1	
Щука обыкновенная (<i>Esox Lucius</i>)	4			2		

Субъекты Российской Федерации	Объекты аквакультуры	Продолжительность периода выращивания (i), лет	Удельный объем изъятия ($P_{\text{паст}}$), кг/га × год			
			6-10°C	11-15°C	16-25°C	выше 26°C
Республика Бурятия Еравно-Харгинская озерная система Еравно-Харгинская и Гусино-Убукунская озерные системы	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	6	10	20	15	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4	10	20	40	
Республика Дагестан	Лосось каспийский (<i>Salmo trutta</i>)	5		10	15	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	2		20	30	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	5			50	10
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	3			100	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	4			100	20
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	4			100	20
Республика Ингушетия	Лосось каспийский (<i>Salmo trutta</i>)	5		10	15	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	2		20	30	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	5			50	10
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	3			100	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	4			100	20
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	4			100	20
Кабардино-Балкарская Республика	Лосось каспийский (<i>Salmo trutta</i>)	5		10	15	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	2		20	30	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	5			50	10
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	3			100	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	4			100	20
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	4			100	20

Субъекты Российской Федерации	Объекты аквакультуры	Продолжительность периода выращивания (i), лет	Удельный объем изъятия ($P_{\text{паст}}$), кг/га × год			
			6-10°C	11-15°C	16-25°C	выше 26°C
Республика Крым горные озера горные озера равнинные озера водохранилища горные озера равнинные озера водохранилища горные озера равнинные озера водохранилища горные озера равнинные озера водохранилища	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	2		5	15	
	Амур белый (<i>Ctenopharyngodon idella</i>)	5			3	
	Амур белый (<i>Ctenopharyngodon idella</i>)	4			5	8
	Амур белый (<i>Ctenopharyngodon idella</i>)	4			7	4
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4			13	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	3			400	540
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	3			15	8
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	5			30	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	4			350	420
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	4			300	350
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	5		18		
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	4			200	150
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	4			50	60
	Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i>)	6		0,1	0,5	
	Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i>)	5		0,2	0,8	
Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i>)	5		0,2	0,7	0,1	
Республика Северная Осетия-Алания	Лосось каспийский (<i>Salmo trutta</i>)	5		10	15	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	2		20	30	
	Амур белый (<i>Ctenopharyngodon idella</i>)	5			50	10
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	3			100	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	4			100	20
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	4			100	20

Субъекты Российской Федерации	Объекты аквакультуры	Продолжительность периода выращивания (i), лет	Удельный объем изъятия ($P_{\text{паст}}$), кг/га × год			
			6-10°C	11-15°C	16-25°C	выше 26°C
Республика Тыва	Гольцы (<i>Salvelinus</i> sp.)	3			21	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	3			21	
	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	7			10	
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	6			30	
	Пелчир (<i>Coregonus peled</i> × <i>Coregonus nasus</i>)	5			40	
Удмуртская Республика	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	7			3	
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	6			30	
	Рипус (<i>Coregonus albula</i>)	3			7	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	6			0,8	
	Карась обыкновенный (<i>Carassius carassius</i>)	2			20	
	Лещ (<i>Abramis brama</i>)	4			30	
	Линь (<i>Tinca tinca</i>)	5			2	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4			20	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	4			2	
	Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i>)	4			0,1	
	Щука обыкновенная (<i>Esox Lucius</i>)	4			2	
	Республика Хакасия (бассейны рек Чулым, Енисей)	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	6			35
Чеченская Республика	Лосось каспийский (<i>Salmo trutta</i>)	5		10	15	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	2		20	30	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	5			50	10
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)				100	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	4			100	20
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	4			100	20

Субъекты Российской Федерации	Объекты аквакультуры	Продолжительность периода выращивания (i), лет	Удельный объем изъятия ($P_{\text{наст}}$), кг/га × год			
			6-10°C	11-15°C	16-25°C	выше 26°C
Алтайский край	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3			15	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	6			12	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4			22	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	5			15	
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	5			15	
Забайкальский край (Ивано-Арахлейская озерная система)	Омудь байкальский (<i>Coregonus migratorius</i>)	5	15	20	15	
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3	15	20	15	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4	10	20	40	
Краснодарский край	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	4			300	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	4			50	100
	Амур черный (<i>Mylopharyn godonpiceus</i>)	4			90	
	Лещ (<i>Abramis brama</i>)	3			30	40
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	3		200	300	400
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	3			250	400
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	4			50	100
Красноярский край бассейн реки Чулым	Кета (<i>Oncorhynchus keta</i>)	5			0,2	
	Кумжа (форель) (<i>Salmo trutta</i>)	3			55	
	Белорыбица и нельма (<i>Stenodus leucichthys</i>)	5			6,3	
бассейн реки Енисей	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	7			11	
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3			35	
бассейны рек Чулым, Енисей	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3			75	
	Пелчир (<i>Coregonus peled</i> × <i>Coregonus nasus</i>)	3			63	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4				17

Субъекты Российской Федерации	Объекты аквакультуры	Продолжительность периода выращивания (i), лет	Удельный объем изъятия ($P_{\text{паст}}$), кг/га × год			
			6-10°C	11-15°C	16-25°C	выше 26°C
Берешское водохранилище	Амур белый (Stenopharyngodon idella)	6				50
	Сазан, карп (Cyprinus carpio)	3				22
	Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix)	4				58
	Толстолобик гибридный (Aristichthys x Hypophthalmichthys)	5				36
	Рак речной узкопалый (Astacus leptodactylus)	3			16	
Пермский край	Сиг (Coregonus lavaretus)	7			3	
	Пелядь (Coregonus peled)	3			30	
	Рипус (Coregonus albula)	3			7	
	Амур белый (Stenopharyngodon idella)	6			0,8	
	Карась обыкновенный (Carassius carassius)	2			20	
	Лещ (Abramis brama)	4			30	
	Линь (Tinca tinca)	4			2	
	Сазан, карп (Cyprinus carpio)	4			20	
	Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix)	5			2	
	Судак обыкновенный (Stizostedion lucioperca)	4			0,1	
Хабаровский край	Щука обыкновенная (Esox Lucius)	3			2	
	Сазан, карп (Cyprinus carpio)	4			20	
	Карась серебряный (Carassius gibelio)	2			15	
	Щука амурская (Esox reichertii)	4			10	
	Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix)	5			5	
	Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis)	5			5	

Субъекты Российской Федерации	Объекты аквакультуры	Продолжительность периода выращивания (i), лет	Удельный объем изъятия ($P_{\text{паст}}$), кг/га × год			
			6-10°C	11-15°C	16-25°C	выше 26°C
Астраханская область озера ильменного типа водохранилища	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	4			10	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	3			100	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	4			80	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	4			50	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	3			130	
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	4			60	
	Пиленгас (<i>Liza haematocheilus</i>)	4			50	
Вологодская область	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	3	10	20	10	
	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	7	2	10	15	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4	40	100	150	
	Щука обыкновенная (<i>Esox Lucius</i>)	3	5	10	15	
Иркутская область	Омуль байкальский (<i>Coregonus migratorius</i>)	5	1	3	3	
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3	5	5	5	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4	5	10	10	
Кемеровская область	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3	10	30	50	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	5		1	4	5
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4		30	40	50
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	5		1	4	5
Кировская область	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	7			3	
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3			30	
	Рипус (<i>Coregonus albula</i>)	3			7	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	5			0,8	
	Карась обыкновенный (<i>Carassius carassius</i>)	2			20	
	Лещ (<i>Abramis brama</i>)	4			30	
	Линь (<i>Tinca tinca</i>)	4			2	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4			20	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	5			2	
	Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i>)	4			0,1	
	Щука обыкновенная (<i>Esox lucius</i>)	4			2	

Субъекты Российской Федерации	Объекты аквакультуры	Продолжительность периода выращивания (i), лет	Удельный объем изъятия ($P_{\text{паст}}$), кг/га × год			
			6-10°C	11-15°C	16-25°C	выше 26°C
Курганская область	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3		60	80	
	Рипус (<i>Coregonus albula</i>)	3		30	50	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	5			5	10
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4			30	50
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	5			5	20
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	5			10	30
Ленинградская область	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	3	10	20	10	
	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	6	2	10	15	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	3	40	150	200	
	Щука обыкновенная (<i>Esox lucius</i>)	3	5	10	15	
Новгородская область	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	3	10	20	10	
	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	6	2	10	15	
озеро Пестовское	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3		20		
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	3	40	150	200	
	Щука обыкновенная (<i>Esox lucius</i>)	3	5	10	15	
Новосибирская область	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3	10	30	50	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	5		1	4	5
	Сазан (карп) (<i>Cyprinus carpio</i>)	4		30	40	50
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	5		1	4	5
Омская область	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3	10	30	50	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	5		1	4	5
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4		30	40	50
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	5		1	4	5
Оренбургская область	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	7			3	
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3			30	
	Рипус (<i>Coregonus albula</i>)	3			7	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	5			0,8	
	Карась обыкновенный (<i>Carassius carassius</i>)	2			20	
	Лещ (<i>Abramis brama</i>)	4			30	

Субъекты Российской Федерации	Объекты аквакультуры	Продолжительность периода выращивания (i), лет	Удельный объем изъятия ($P_{\text{паст}}$), кг/га × год			
			6-10°C	11-15°C	16-25°C	выше 26°C
	Линь (<i>Tinca tinca</i>)	4			2	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4			20	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	5			2	
	Судак (<i>Stizostedion lucioperca</i>)	4			0,1	
	Щука (обыкновенная <i>Esox lucius</i>)	4			2	
Томская область	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3	10	30	50	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	5		1	4	5
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4		30	40	50
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	5		1	4	5
Псковская область	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	3	10	20	10	
	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	6	2	10	15	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4	40	150	200	
	Щука обыкновенная (<i>Esox lucius</i>)	3	5	10	15	
Ростовская область	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	4			300	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodonidella</i>)	4			50	100
	Амур черный (<i>Mylopharyn godonpiceus</i>)	4			90	
	Лещ (<i>Abramis brama</i>)	3			30	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	3		200	300	400
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	3			250	400
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	4			50	100
Сахалинская область озеро Сладкое озеро Невское озеро Тунайча озеро Айнское озеро Сладкое озеро Сладкое озеро Невское озеро Сладкое	Гольцы (<i>Salvelinus sp.</i>)	4			1,5	
	Карась серебряный (<i>Carassius gibelio</i>)	2			2,5	
	Карась серебряный (<i>Carassius gibelio</i>)	2			9	
	Карась серебряный (<i>Carassius gibelio</i>)	2			12	
	Карась серебряный (<i>Carassius gibelio</i>)	2			0,5	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	3			1,2	
	Щука амурская (<i>Esox reichertii</i>)	3			9	
	Щука амурская (<i>Esox reichertii</i>)	3			2	

Субъекты Российской Федерации	Объекты аквакультуры	Продолжительность периода выращивания (i), лет	Удельный объем изъятия ($P_{\text{паст}}$), кг/га × год			
			6-10°C	11-15°C	16-25°C	выше 26°C
Свердловская область	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	7			3	
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3		60	80	
	Рипус (<i>Coregonus albula</i>)	3		30	50	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	5			5	10
	Карась обыкновенный (<i>Carassius carassius</i>)	2			20	
	Лещ (<i>Abramis brama</i>)	4			30	
	Линь (<i>Tinca tinca</i>)	4			2	
	Сазан (каrp) (<i>Cyprinus carpio</i>)	4			30	50
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	5			2	20
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	5			10	30
	Судак обыкновенный (<i>Stizostedion lucioperca</i>)	4			0,1	
Тюменская область	Щука обыкновенная (<i>Esox lucius</i>)	4			2	
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3		25	18	
Челябинская область	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4		12	16	
	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	7			3	
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	3		60	80	
	Рипус (<i>Coregonus albula</i>)	3		30	50	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	5			5	10
	Карась обыкновенный (<i>Carassius carassius</i>)	3			20	
	Лещ (<i>Abramis brama</i>)	5			30	
	Линь (<i>Tinca tinca</i>)	5			2	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4			30	50
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	5			2	20
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	5			10	30
	Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i>)	5			0,1	
	Щука обыкновенная (<i>Esox lucius</i>)	4			2	

б) реки

Субъекты Российской Федерации	Объекты аквакультуры	Продолжительность периода выращивания, лет	Удельный объем изъятия ($P_{\text{паст}}$), кг/га × год			
			6–10 °С	11–15 °С	16–25 °С	выше 26°С
Республика Крым	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	4			2	1
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	3			40	30
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	4			15	10
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	4			7	5
	Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i>)	3		0,1	1,5	1
	Сом обыкновенный (<i>Silurus glanis</i>)	3			0,5	0,1
Краснодарский край	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	4			1,5	
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	4			3	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	3			3	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	4			3	
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	4			3,5	
Хабаровский край	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	4			15	
	Карась серебряный (<i>Carassius gibelio</i>)	2			8	
	Щука амурская (<i>Esox reichertii</i>)	4			5	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	5			3	
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	5			3	
Сахалинская область	Карась серебряный (<i>Carassius gibelio</i>)	3			135	
	река Поронай Щука амурская (<i>Esox reichertii</i>)	3			95	
	река Тымь Щука амурская (<i>Esox reichertii</i>)	3			25	

в) лиманы

Субъекты Российской Федерации	Объекты аквакультуры	Продолжительность периода выращивания, лет	Удельный объем изъятия ($P_{\text{паст}}$), кг/га × год			
			6-10°C	11-15°C	16-25°C	выше 26°C
Республика Крым	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2			4	6
	Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i>)	2		0,3	0,9	
	Пиленгас (<i>Liza haematocheilus</i>)	2			3	20
	Остронос (<i>Liza saliens</i>), Сингиль (<i>Liza aurata</i>), Лобан (<i>Mugil cephalus</i>)	2			3,5	10
Краснодарский край	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	3			5	200
	Сазан (<i>Cyprinus carpio</i>)	2			60	70
	Карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2				200
	Тарань (<i>Rutilus rutilus form.</i>)	2				20
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	3			5	
	Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i>)	3			80	60
	Пиленгас (<i>Liza haematocheilus</i>)	3				80
Ростовская область	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	3				200
	Сазан (<i>Cyprinus carpio</i>)	2			60	70
	Карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2				200
	Тарань (<i>Rutilus rutilus form.</i>)	2				20
	Судак обыкновенный (<i>Sander lucioperca</i>)	3			80	60
	Пиленгас (<i>Liza haematocheilus</i>)	3				80

г) внутренние морские воды, территориальное море Российской Федерации

Субъекты Российской Федерации	Объекты аквакультуры	Продолжительность периода выращивания, лет	Удельный объем изъятия ($P_{\text{паст}}$), кг/га × год			
			6-10 °С	11-15°С	16-25°С	выше 26°С
Краснодарский край	Рыбец (<i>Vimba vimba</i>)					45
	Шемая (<i>Chalcalburnus chalcoides</i>)					45
	Пиленгас (<i>Liza haematocheilus</i>)					300
Приморский край	Гребешок приморский (<i>Mizuhopecten yessoensis</i>)	4		5 000	5 000	
	Морской еж серый (<i>Strongylocentrotus intermedius</i>)	6		3 400	3 400	
	Трепанг дальневосточный (<i>Apostichopus japonicas</i>)	6		2 000	2 000	
	Ламинария японская (<i>Saccharina japonica</i>)	1, 2	70 000	70 000		
Хабаровский край	Гребешок приморский (<i>Mizuhopecten yessoensis</i>)	5	5 000	5 000		
	Ламинария японская (<i>Saccharina japonica</i>)	2	70 000	70 000		
Ростовская область	Рыбец (<i>Vimba vimba</i>)					45
	Шемая (<i>Chalcalburnus chalcoides</i>)					45
	Пиленгас (<i>Liza haematocheilus</i>)					300
Сахалинская область	Гребешок приморский (<i>Mizuhopecten yessoensis</i>)		5 000			
	Трепанг дальневосточный (<i>Apostichopus japonicas</i>)		500			

Приложение №3
к Методике определения
объема и видового состава
объектов аквакультуры,
подлежащих разведению
и (или) содержанию, выращиванию,
а также выпуску в водный объект
и изъятию из водного объекта
в границах рыбоводного участка»

**Удельный объем подлежащих изъятию объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении
индустриальной аквакультуры, и продолжительность периода выращивания указанных объектов аквакультуры
для разных субъектов Российской Федерации**

Субъекты Российской Федерации	Объекты аквакультуры	Продолжительность периода выращивания (i), лет	Удельный объем изъятия ($P_{индустр}$), т/га × год			
			6-10°C	11-15°C	16-25°C	выше 26°C
Республика Алтай	Осетр сибирский (<i>Acipenser baerii</i>)	3		0,4		
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2		0,4		
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	2		0,2		
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	1, 2		0,8		
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2		0,2		
	Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>)	2		0,8		

Республика Башкортостан	Осетр русский (<i>Acipenser queldenstaedtii</i>)	3			4,8	
	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	2			6	
	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3			1,5	
	Веслонос (<i>Polyodon spathula</i>)	2			0,07	
	Кумжа (форель) (<i>Salmo trutta</i>)	1, 2		6,5		
	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	2	0,041			
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	1	0,096			
	Рипус (<i>Coregonus albula</i>)	1	0,054			
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	2			0,35	
	Карась обыкновенный (<i>Carassius carassius</i>)	1			3	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	1, 2			25	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2			7	
Республика Дагестан (садки во внутренних морских водах)	Белуга (<i>Huso huso</i>)	3			150	
	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3			150	
	Лосось каспийский (<i>Salmo trutta</i>)	2		200,0	300,0	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2		230,0	320,0	
(садки во внутренних водах)	Лосось каспийский (<i>Salmo trutta</i>)	2		120,0	180,0	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2		220,0	300,0	
Республика Ингушетия	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3			150	
	Лосось каспийский (<i>Salmo trutta</i>)	2		120,0	180,0	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2		220,0	300,0	

Кабардино-Балкарская Республика (садки в водохранилищах)	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3			150	
	Лосось каспийский (<i>Salmo trutta</i>)	2		120,0	180,0	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2		220,0	300,0	
Республика Карелия	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	2	75	180		
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2	100	250		
Республика Северная Осетия - Алания (садки в водохранилищах)	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3			150	
	Лосось каспийский (<i>Salmo trutta</i>)	2		120,0	180,0	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2		220,0	300,0	
Республика Тыва	Осетр сибирский (<i>Acipenser baerii</i>)	3			70	
	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	2			70	
	Кумжа (форель) (<i>Salmo trutta</i>)	1, 2	45	85		
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2				300
	Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>)	2				700
Удмуртская Республика	Осетр русский (<i>Acipenser queldenstaedtii</i>)	3			4,8	
	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	2			6	
	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3			1,5	
	Веслонос (<i>Polyodon spathula</i>)	2			0,07	
	Кумжа (форель) (<i>Salmo trutta</i>)	1, 2		6,5		
	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	2	0,041			
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	1, 2	0,096			
	Рипус (<i>Coregonus albula</i> form.)	1, 2	0,054			
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)					0,35
	Карась обыкновенный (<i>Carassius carassius</i>)	2				3
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2				25
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2				7

Республика Хакасия	Осетр сибирский (<i>Acipenser baerii</i>)	3			70	
	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	2			70	
	Кумжа (форель) (<i>Salmo trutta</i>)	1,2	45	85		
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2				300
	Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>)	2				700
Республика Крым	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3			30	60
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	2	20	50	80	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2	150	240	300	
	Пиленгас (<i>Liza haematocheilus</i>)	2			40	80
	Лаврак обыкновенный (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	2			100	300
	Мидия средиземноморская (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)	2		1,0	15	0,5
	Устрица тихоокеанская (<i>Crassostrea gigas</i>)	3			3	6
Чеченская Республика (садки в водохранилищах)	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3			150	
	Лосось каспийский (<i>Salmo trutta</i>)	2		120,0	180,0	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2		220,0	300,0	
Алтайский край	Осетр сибирский (<i>Acipenser baerii</i>)	3		0,4		
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2		0,4		
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	2		0,2		
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2		0,8		
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2		0,2		
	Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>)	2		0,8		

Краснодарский край	Белуга (<i>Huso huso</i>)	3			0,2	
	Осетр русский (<i>Acipenser queldenstaedtii</i>)	3			0,3	
	Севрюга (<i>Acipenser stellatus</i>)	3			0,03	
	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	2			0,3	
	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3			0,6	
	Веслонос (<i>Polyodon spathula</i>)	2			0,15	0,2
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	2		0,2		
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2			0,2	0,35
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2			0,45	
	Пиленгас (<i>Liza haematocheilus</i>)	2				0,3
	Мидия средиземноморская (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)	2			20	5
	Устрица тихоокеанская (<i>Crassostrea gigas</i>)	3			15	20
	Красноярский край	Осетр сибирский <i>Acipenser baerii</i>	3			70
Стерлядь <i>Acipenser ruthenus</i>		2			70	
Кумжа (форель) (<i>Salmo trutta</i>)		1, 2	45	85		
Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)		2				300
Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>)		2				700
Приморский край	Мидия тихоокеанская (<i>Mytilus trossulus</i>) (в двухлетнем цикле)	1, 2		35	35	
	Устрица тихоокеанская (<i>Crassostrea gigas</i>)	3		45	45	
	Гребешок приморский (<i>Mizuhopecten yessoensis</i>) (в садках в 3-4-летнем цикле)	3, 4		25	25	
	Ламинария японская (<i>Saccharina japonica</i>) (на поводцах в 2-х-летнем цикле)	2	70	70		
	Ламинария японская (<i>Saccharina japonica</i>) (на поводцах в однолетнем цикле)	1	50	50		

	Ламинария японская (<i>Saccharina japonica</i>) (на искусственных донных субстратах в 2-х-летнем цикле)	2	70	70		
Хабаровский край	Гребешок приморский (<i>Mizuhopecten yessoensis</i>)	4	25	25		
	Ламинария японская (<i>Saccharina japonica</i>) (на поводках в 2-х-летнем цикле)	2	70	70		
	Ламинария японская (<i>Saccharina japonica</i>) (на донных субстратах в 2-х-летнем цикле)	2	70	70		
Астраханская область	Белуга (<i>Huso huso</i>)	3			200,0	
	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	2			200,0	
	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3			250,0	
Вологодская область	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3	1,0	10,0	20	
	Лосось атлантический (семга) (<i>Salmo salar</i>)	2	0,05	0,2	0,5	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2	10	10	300	
	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	2	0,1	0,8	1,0	
Иркутская область (р. Ангара)	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2	0,2	0,3		
Кемеровская область	Осетр сибирский (<i>Acipenser baerii</i>)	3		0,4		
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2		0,4		
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	2		0,2		
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2		0,8		
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2		0,2		
	Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>)	2		0,8		
Кировская область	Осетр русский (<i>Acipenser queldenstaedtii</i>)	3			4,8	
	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	2			6	
	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3			1,5	
	Веслонос (<i>Polyodon spathula</i>)	2			0,07	
	Кумжа (форель) (<i>Salmo trutta</i>)	1, 2		6,5		

	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	2	0,041			
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	1	0,096			
	Рипус (<i>Coregonus albula</i>)	1	0,054			
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	2			0,35	
	Карась обыкновенный (<i>Carassius carassius</i>)	1			3	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2			25	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2			7	
Курганская область	Осетр сибирский (<i>Acipenser baerii</i>)	3	0,3	0,6	0,8	
	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	2			0,3	0,5
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2			0,05	0,2
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	2			0,05	0,1
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2			0,3	0,5
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2			0,05	0,2
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	2			0,1	0,3
	Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>)	2			0,1	0,3
Ленинградская область	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3	1,0	10,0	20	
	Лосось атлантический (семга) (<i>Salmo salar</i>)	2	0,05	0,2	0,5	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2	10	10	300	
	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	2	0,1	0,8	1,0	
Новгородская область (озеро Велье)	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2	0,56	0,63	1,17	
	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	2	0,01	0,16	0,19	
(озеро Селигер)	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2	0,40	0,68	1,1	
(озеро Льянное)	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2	0,12	0,07	0,42	

Новосибирская область	Осетр сибирский (<i>Acipenser baerii</i>)	3		0,4		
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2		0,4		
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	2		0,2		
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2		0,8		
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2		0,2		
	Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>)	2		0,8		
Омская область	Осетр сибирский (<i>Acipenser baerii</i>)	3		0,4		
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2		0,4		
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	2		0,2		
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2		0,8		
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2		0,2		
	Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>)	2		0,8		
Оренбургская область	Осетр русский (<i>Acipenser queldenstaedtii</i>)	3			4,8	
	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	2			6	
	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3			1,5	
	Веслонос (<i>Polyodon spathula</i>)	2			0,07	
	Кумжа (форель) (<i>Salmo trutta</i>)	1, 2		6,5		
	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	2	0,041			
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	1	0,096			
	Рипус (<i>Coregonus albula</i>)	1	0,054			
	Карась обыкновенный (<i>Carassius carassius</i>)	1				3
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2				25
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2				7
	Осетр русский (<i>Acipenser queldenstaedtii</i>)	3				4,8

Пермский край	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	2			6	
	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3			1,5	
	Веслонос (<i>Polyodon spathula</i>)	2			0,07	
	Кумжа (форель) (<i>Salmo trutta</i>)	1, 2		6,5		
	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	2	0,041			
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	1	0,096			
	Рипус (<i>Coregonus albula</i>)	1	0,054			
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	2			0,35	
	Карась обыкновенный (<i>Carassius carassius</i>)	1			3	
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2			25	
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2			7	
	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3	1,0	10,0	20	
Псковская область	Лосось атлантический (семга) (<i>Salmo salar</i>)	2	0,05	0,2	0,5	
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2	10	10	300	
	Сиг (<i>Coregonus lavaretus</i>)	2	0,1	0,8	1,0	
Ростовская область	Белуга (<i>Huso huso</i>)	3			0,3	
	Осетр русский (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>)	3			0,2	
	Севрюга (<i>Acipenser stellatus</i>)	3			0,05	
	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	2			0,3	
	Бестер (<i>Huso huso</i> x <i>Acipenser ruthenus</i>)	3			0,6	
	Веслонос (<i>Polyodon spathula</i>)	2			0,15	0,2
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	2		0,2		
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2			0,2	0,35
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2			0,45	
	Пиленгас (<i>Liza haematocheilus</i>)	2				0,3

Сахалинская область	Осетр сибирский (<i>Acipenser baerii</i>)	3			133	
	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	2			0,3	0,5
Свердловская область	Веслонос (<i>Polyodon spathula</i>)	2			100	100
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2			0,05	0,2
	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	2			0,05	0,1
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2			0,3	0,5
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2			0,05	0,2
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	2			0,1	0,3
	Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>)	2			0,1	0,3
	Осетр сибирский (<i>Acipenser baerii</i>)	3		0,4		
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2		0,4		
Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	2		0,2			
Томская область	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2		0,8		
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2		0,2		
	Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>)	2		0,8		
	Муксун (<i>Coregonus muksun</i>)	2	0,33			
	Чир (<i>Coregonus nasus</i>)	2	0,42			
	Пелядь (<i>Coregonus peled</i>)	1	0,5			
Тюменская область	Осетр сибирский (<i>Acipenser baerii</i>)	3	0,3	0,6	0,8	
	Стерлядь (<i>Acipenser ruthenus</i>)	2			0,3	0,5
	Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	1, 2			0,05	0,2
Челябинская область	Амур белый (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	2			0,05	0,1
	Сазан, карп (<i>Cyprinus carpio</i>)	2			0,3	0,5
	Толстолобик белый (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	2			0,05	0,2
	Толстолобик пестрый (<i>Aristichthys nobilis</i>)	2			0,1	0,3
	Сомик канальный (<i>Ictalurus punctatus</i>)	2			0,1	0,3

Приложение №4
к Методике определения
объема и видового состава
объектов аквакультуры,
подлежащих разведению
и (или) содержанию, выращиванию,
а также выпуску в водный объект
и изъятию из водного объекта
в границах рыбоводного участка

**Значения минимальной массы и выживаемости объектов аквакультуры,
выращиваемых при осуществлении индустриальной аквакультуры**

Объекты аквакультуры, выращиваемые при осуществлении индустриальной аквакультуры	Выживаемость в зависимости от продолжительности периода выращивания, %			Минимальная масса объекта аквакультуры, кг (ш)
	1 год (S ₁)	2 год (S ₂)	3 год (S ₃)	
Осетровые виды рыб (Acipenseridae)	90	95	98	1,5
Веслоносовые (Polyodontidae)	90	95		2
Лососевые виды рыб (Salmonidae)				
в однолетнем цикле	80	-		0,3
в двухлетнем цикле	80	90		2
Сиговые виды рыб (Coregonidae)	60	70	70	0,3
Карповые виды рыб (Cyprinidae)	90	90		0,5
Окуновые (Percidae)	80	85		0,3
Сомовые (Siluridae)	90	95		1,5
Мидия тихоокеанская (Mytilus trossulus)				
в однолетнем цикле	75			0,009
в двухлетнем цикле	75	95		0,012
Трепанг дальневосточный (Apostichohus japonicus)	80	85	95	0,0003
Устрица тихоокеанская (Crassostrea gigas)	76,5	66		0,1
Сахарина японская (Saccharina japonica)				
в однолетнем цикле	20			0,3
в двухлетнем цикле		60		0,5